

1: 77. 1983.

本变种与原变种不同点在于小枝、叶柄和花梗均密被星状短柔毛和疏生单生长柔毛，而在叶上面散生长柔毛。 果期6—8月。

产湖南(道县)、浙江(丽水)和广西(大瑶山)。生于山地路旁。模式标本采自湖南道县。

30. 白花龙(岭南大学校园植物名录) 白龙条、扫酒树、棉子树(广东),扣子柴,梦童子、响铃子(江西) 图版41:6—12

Styrax faberi Perk. in Engler, Pflanzenr. 30 (IV-241): 33. 1907; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 187. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 803. 1936; 侯宽昭, 广州植物志 475, 1956; S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. 18(2): 163. 1980. — *S. faberi* Perk. *acutiserratus* Perk. op. cit. 34. — *S. iopilina* Diels in Not. Bot. Gart. Mus. Berlin 14: 1028. 1926. — *S. serrulata* auct. non Roxb.: Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 77. 1889. p. p.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 146. 1927.


30a. 白花龙(原变种)

Styrax faberi Perk. var. ***faberi***

灌木,高1—2米;嫩枝纤弱,具沟槽,扁圆形,密被星状长柔毛,或被毛渐脱落至完全无毛,老枝圆柱形,紫红色,直立或有时蜿蜒状。叶互生,纸质,有时侧枝最下两叶近对生而较大,椭圆形、倒卵形或长圆状披针形,长4—11厘米,宽3—3.5厘米,顶端急渐尖或渐尖,基部宽楔形或近圆形,边缘具细锯齿,当年生小枝的嫩叶两面均无毛至密被褐色或灰色星状柔毛,侧脉每边5—6条,第三级小脉网状,两面均明显隆起;叶柄长1—2毫米,密被黄褐色星状柔毛。总状花序顶生,有花3—5朵,下部常单花腋生,长3—4厘米;花序梗和花梗均密被灰黄色星状短柔毛;花白色,长1.2—1.5(—2)厘米;花梗长8—15厘米,花后常向下弯;小苞片钻形,长2—3毫米,生于花梗近基部,密被灰黄色星状短柔毛,易脱落;花萼杯状,膜质,高4—5(—8)毫米,宽3—4(—6)毫米,外面密被灰黄色星状绒毛和星状短柔毛,萼齿5,三角形或钻形,边缘有时具褐色腺点;花冠裂片膜质,披针形或长圆形,长5—15毫米,宽2.5—3毫米,外面密被白色星状短柔毛,边缘狭的内折或有时同一花中1—2裂片边缘一边内折,另一边平坦,在花蕾时作镊合状排列或呈稍内向覆瓦状排列,花冠管长3—4毫米,无毛;雄蕊长9—15毫米,花丝下部联合成管,上部分离,分离部分的下部密被长柔毛,上部无毛,花药长圆状披针形,长约5毫米;花柱较花冠长,被毛。果实倒卵形或近球形,长6—8毫米,直径5—7毫米,外面密被灰色星状短柔毛,果皮厚约0.5毫米,平滑。花期4—6月,果期8—10月。

产安徽、湖北、江苏、浙江、湖南、江西、福建、台湾、广东、广西、贵州和四川等省区。生于海拔100—600米低山区和丘陵地灌丛中。模式标本采自广东广州。

本种与赛山梅 *Styrax confusus* Hemsl. 很接近,但本种为一小灌木;叶纸质;总状花



1—5. 台湾安息香 *Styrax formosanus* Matsum.: 1. 花枝, 2. 花, 雄蕊腹、背面观, 4. 果实开裂, 5. 种子。6—12. 白花龙 *Styrax faberi* Perk.: 6. 花枝, 7. 果枝, 8. 花, 9. 花冠展开示雄蕊, 10. 雌蕊, 11. 果实开裂, 12. 种子。(黄少容、邓晶发绘)