

1898; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 531. 1900, p. p. excl. specim. Giraldi 1643; Schneid. in Bot. Jahrb. 36, Beibl. **82**: 86. 1905, p. p. et Ill. Handb. Laubh. **2**: 772, f. 485 d-f, 486 a-e. 1911; Komarov in Act. Hort. Petrop. **25**: 252. 1907; Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles **2**: 569. 1914; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. **6**: 3301. 1917 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 781. 1954; Lingelsh. in Engl. Pflanzrenr. **72**(IV-243): 88. 1920; McKelvey, Lilac 175, pl. 92—94. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1053, 图 936. 1937; M. Noda, Fl. N.-E. Prov. China 1016, pl. 203, f. 3. 1971, sphalm. f. 4; 中国高等植物图鉴 **3**: 351, 图 4655. 1974; Kitagawa, Neo-Lineament. Fl. Mansh. 511. 1979.—*S. vulgaris* Linn. var. *oblata* Franch. in Rev. Hort. **1891**: 330. 1891.—*S. oblata* var. *a. typica* Lingelsh. in Engl. Pflanzrenr. **72** (IV-243): 88. 1920, p. p.—*S. chinensis* auct. non Schmidt ex Willd. 1796; Bunge in Mem. Acad. Sci. St. Petersb. Sav. Etrang. **2**: 116. 1835.—*S. vulgaris* auct. non L. 1753; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 83. 1889.

12a. 紫丁香(原变种) 图版 20: 1—2

var. *oblata*

灌木或小乔木, 高可达 5 米; 树皮灰褐色或灰色。小枝、花序轴、花梗、苞片、花萼、幼叶两面以及叶柄均无毛而密被腺毛。小枝较粗, 疏生皮孔。叶片革质或厚纸质, 卵圆形至肾形, 宽常大于长, 长 2—14 厘米, 宽 2—15 厘米, 先端短凸尖至长渐尖或锐尖, 基部心形、截形至近圆形, 或宽楔形, 上面深绿色, 下面淡绿色; 茎枝上叶片常呈长卵形, 先端渐尖, 基部截形至宽楔形; 叶柄长 1—3 厘米。圆锥花序直立, 由侧芽抽生, 近球形或长圆形, 长 4—16(—20) 厘米, 宽 3—7(—10) 厘米; 花梗长 0.5—3 毫米; 花萼长约 3 毫米, 萼齿渐尖、锐尖或钝; 花冠紫色, 长 1.1—2 厘米, 花冠管圆柱形, 长 0.8—1.7 厘米, 裂片呈直角开展, 卵圆形、椭圆形至倒卵圆形, 长 3—6 毫米, 宽 3—5 毫米, 先端内弯略呈兜状或不内弯; 花药黄色, 位于距花冠管喉部 0—4 毫米处。果倒卵状椭圆形、卵形至长椭圆形, 长 1—1.5(—2) 厘米, 宽 4—8 毫米, 先端长渐尖, 光滑。 花期 4—5 月, 果期 6—10 月。

产于东北、华北、西北(除新疆)以至西南达四川西北部(松潘、南坪)。生山坡丛林、山沟溪边、山谷路旁及滩地水边, 海拔 300—2 400 米。长江以北各庭园普遍栽培。最初是根据栽种在我国北方庭园中的植物发表的。

其吸收 SO₂ 的能力较强, 对 SO₂ 污染具有一定净化作用; 花可提制芳香油; 嫩叶可代茶。

1918, Nakai 根据朝鲜标本发表了 *S. dilatata* Nakai. 1926, Rehder 又把它作为 *S. oblata* Lindl. 的变种。根据我国现有标本以及野外观察, 从 *S. oblata* 中难以区分出 *S. dilatata*, 如果后者确实成立, 则我国可能无野生。

12b. 白丁香(变种)(河北习见树木图说) 白花丁香(东北木本植物图志)



1—2.紫丁香 *Syringa oblata* Lindl. var. *oblata*, 1.果枝; 2.花冠展开。3—6.欧丁香 *S. vulgaris* Linn. f. *vulgaris*, 3.花序; 4—6.叶形。7.什锦丁香 *S. × chinensis* Schmidt ex Willd. f. *chinensis*. 小枝示叶。(陆锦文绘)