

var. **alba** Hort. ex Rehd. in Bailey, Cycl. Amer. Hort. **4**: 1763. 1902 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 781. 1954; Schelle in Beissner & al., Handb. Laubh. -Ben. 414. 1903, "f."; 东北木本植物图志 476. 1955. — *S. affinis* L. Henry in Journ. Soc. Hort. France ser. 4, **2**: 731. 1901; Schneid. in Bot. Jahrb. 36, Beibl. **82**: 87. 1905, p. p. excl. specim. Giraldis 737; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. **6**: 3301. 1917. — *S. oblata* var. *affinis* (L. Henry) Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. **72**(IV-143); **88**. 1920, excl. syn. *S. giraldi* Lemoine; McKelvey, Lilac 182. 1928; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **9**: 110. 1928; 周汉藩, 河北习见树木图说 217. 1934; 陈嵘, 中国树木分类学 1054. 1937; 中国高等植物图鉴 **3**: 351. 1974. — *S. oblata* var. *a. typica* Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. **72**(IV-243): **88**. 1920, p. p. — *S. oblata* var. *a. typica* f. *alba* Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. **72**(IV-243): **88**. 1920.

花白色; 叶片较小, 基部通常为截形、圆楔形至近圆形, 或近心形。花期 4—5 月。

我国长江流域以北普遍栽培。

采自辽宁东南部的某些标本, 过去被鉴定为 *S. dilatata* var. *alba* Wang & Skv., 可能是本种的野生类型。

#### 12c. 毛紫丁香(变种)(中国高等植物图鉴) 紫萼丁香(中国树木分类学)

var. **giraldi** (Lemoine) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **7**: 34. 1926, **9**: 110. 1928 et Bibl. Cult. Trees & Shrubs 566. 1949 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6. 781. 1954; McKelvey, Lilac 182, pl. 95—99. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1054. 1937; 中国高等植物图鉴 **3**: 351. 1974. — *S. villosa giraldi* Spreng. 3rd. List. Pl. 2. 1903, nom. nud. — *S. giraldi* Lemoine Cat. no. **155**: 8. 1903, no. **157**: 35. 1904. — *S. S. affinis* var. *giraldi* Schneid. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **9**: 80. 1910 et Ill. Handb. Laubh. **2**: 774. 1911; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. **6**: 3301. 1917. — *S. oblata* var. *a. typica* Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. **72**(IV-243): **88**. 1920, p. p. — *S. affinis geraldiana* Sargent in Bull. Arn. Arb. n. s. **8**: 23. 1922. — ?*S. oblata* var. *hupehensis* Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. **17**: 690. 1910; McKelvey, Lilac 191. 1928; 中国高等植物图鉴 **3**: 351. 1974. — *S. oblata* auct. non Lindl. 1859: Diels in Bot. Jahrb. **29**: 531. 1900, p. p. quoad specim. Giraldis 1643; Schneid. in Bot. Jahrb. 36, Beibl. **82**: 86. 1905, p. p. — *S. affinis* auct. non L. Henry 1901: Schneid. in Bot. Jahrb. 36, Beibl. **82**: 87. 1905, p. p. quoad specim. Giraldis 737.

与原变种区别在于本变种的小枝、花序和花梗除具腺毛外, 被微柔毛或短柔毛, 或无

毛;叶片基部通常为宽楔形、近圆形至截形,或近心形,上面除有腺毛外,被短柔毛或无毛,下面被短柔毛或柔毛,有时老时脱落;叶柄被短柔毛、柔毛或无毛。花期5月,果期7—9月。

产于甘肃、陕西、湖北以至东北。生海拔1100—2600米的山坡林下或灌丛中。模式标本采自陕西。

### 13. 欧丁香(华北经济植物志要) 洋丁香(中国树木分类学)

*Syringa vulgaris* Linn. Sp. Pl. 9. 1753; Willd. Sp. Pl. 48. 1797; Vahl, Enum. Pl. 1: 38. 1804; DC. Prodr. 8: 282. 1844; Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2, 2: 39. 1879; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 774, f. 485 a-c, 486 i-m. 1911; Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles 2: 572. 1914; McKelvey, Lilac 201, pl. 119—123. 1928; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 566. 1949 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 781. 1954; 陈嵘, 中国树木分类学 1054, 图 937. 1937; 华北经济植物志要 385. 1953; M. Noda, Fl. N. E. Prov. China 1018. 1971. — *S. caerulea* Johnston, Hist. Nat. Arb. 2: 219, t. 122, f. 1769. — *Lilac vulgaris* Lamarck, Fl. Franc. 2: 305. 1778. — *S. latifolia* Salisb. Prodr. Stirp. Chap. Allert. 13. 1796.

#### 13a. 欧丁香(原变型) 图版 20:3—6

##### f. *vulgaris*

灌木或小乔木,高3—7米;树皮灰褐色。小枝、叶柄、叶片两面、花序轴、花梗和花萼均无毛,或具腺毛,老时脱落。小枝棕褐色,略带四棱形,疏生皮孔。叶片卵形、宽卵形或长卵形,长3—13厘米,宽2—9厘米,先端渐尖,基部截形、宽楔形或心形,上面深绿色,下面淡绿色;叶柄长1—3厘米。圆锥花序近直立,由侧芽抽生,宽塔形至狭塔形,或近圆柱形,长10—20厘米;花序轴疏生皮孔;花梗长0.5—2毫米;花芳香;萼齿锐尖至短渐尖;花冠紫色或淡紫色,长0.8—1.5厘米,直径约1厘米,花冠管细弱,近圆柱形,长0.6—1厘米,裂片呈直角开展,椭圆形、卵形至倒卵圆形,先端略呈兜状,或不内弯;花药黄色,位于距花冠管喉部0—1(—2)毫米处,稀伸出。果倒卵状椭圆形、卵形至长椭圆形,长1—2厘米,先端渐尖或骤凸,光滑。花期4—5月,果期6—7月。

原产东南欧。华北各省普遍栽培,东北、西北以及江苏各地也有栽培。

#### 13b. 白花欧丁香(变型) 白花洋丁香(中国树木分类学)

f. *alba* (Weston) Voss, Vilmor. Blumengärt. 1: 652. 1895; Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72(IV-243): 89. 1920; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 567. 1949. — *S. vulgaris* var. *alba* Weston, Bot. Univ. 1: 289. 1770, “2”; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. 6: 3301. 1917 et Man. Cult. Trees & Shrubs 756. 1927; McKelvey, Lilac 234. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1055. 1937.

花白色。花期5月。