

毛;叶片基部通常为宽楔形、近圆形至截形,或近心形,上面除有腺毛外,被短柔毛或无毛,下面被短柔毛或柔毛,有时老时脱落;叶柄被短柔毛、柔毛或无毛。花期5月,果期7—9月。

产于甘肃、陕西、湖北以至东北。生海拔1100—2600米的山坡林下或灌丛中。模式标本采自陕西。

13. 欧丁香(华北经济植物志要) 洋丁香(中国树木分类学)

Syringa vulgaris Linn. Sp. Pl. 9. 1753; Willd. Sp. Pl. 48. 1797; Vahl, Enum. Pl. 1: 38. 1804; DC. Prodr. 8: 282. 1844; Decne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris ser. 2, 2: 39. 1879; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 774, f. 485 a-c, 486 i-m. 1911; Bean, Trees & Shrubs Brit. Isles 2: 572. 1914; McKelvey, Lilac 201, pl. 119—123. 1928; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 566. 1949 et Man. Cult. Trees & Shrubs ed. 6, 781. 1954; 陈嵘, 中国树木分类学 1054, 图 937. 1937; 华北经济植物志要 385. 1953; M. Noda, Fl. N. E. Prov. China 1018. 1971. — *S. caerulea* Johnston, Hist. Nat. Arb. 2: 219, t. 122, f. 1769. — *Lilac vulgaris* Lamarck, Fl. Franc. 2: 305. 1778. — *S. latifolia* Salisb. Prodr. Stirp. Chap. Allert. 13. 1796.

13a. 欧丁香(原变型) 图版 20:3—6

f. *vulgaris*

灌木或小乔木,高3—7米;树皮灰褐色。小枝、叶柄、叶片两面、花序轴、花梗和花萼均无毛,或具腺毛,老时脱落。小枝棕褐色,略带四棱形,疏生皮孔。叶片卵形、宽卵形或长卵形,长3—13厘米,宽2—9厘米,先端渐尖,基部截形、宽楔形或心形,上面深绿色,下面淡绿色;叶柄长1—3厘米。圆锥花序近直立,由侧芽抽生,宽塔形至狭塔形,或近圆柱形,长10—20厘米;花序轴疏生皮孔;花梗长0.5—2毫米;花芳香;萼齿锐尖至短渐尖;花冠紫色或淡紫色,长0.8—1.5厘米,直径约1厘米,花冠管细弱,近圆柱形,长0.6—1厘米,裂片呈直角开展,椭圆形、卵形至倒卵圆形,先端略呈兜状,或不内弯;花药黄色,位于距花冠管喉部0—1(—2)毫米处,稀伸出。果倒卵状椭圆形、卵形至长椭圆形,长1—2厘米,先端渐尖或骤凸,光滑。花期4—5月,果期6—7月。

原产东南欧。华北各省普遍栽培,东北、西北以及江苏各地也有栽培。

13b. 白花欧丁香(变型) 白花洋丁香(中国树木分类学)

f. *alba* (Weston) Voss, Vilmor. Blumengärt. 1: 652. 1895; Lingelsh. in Engl. Pflanzenr. 72(IV-243): 89. 1920; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 567. 1949. — *S. vulgaris* var. *alba* Weston, Bot. Univ. 1: 289. 1770, “2”; Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. 6: 3301. 1917 et Man. Cult. Trees & Shrubs 756. 1927; McKelvey, Lilac 234. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 1055. 1937.

花白色。花期5月。