

式标本采自广西凌云。

20. 狭叶女贞(植物分类学报)

Ligustrum angustum Miao in Acta Phytotax. Sin. **23**(1): 55. 1985; M. C. Chang & B. M. Miao in Investigat. Stud. Nat. **6**: 85. 1986.

直立小灌木, 高约 1.5 米。枝和小枝均呈灰黄色, 圆柱形, 密被圆形皮孔, 小枝节处稍扁, 被微柔毛, 老枝无毛。叶片薄革质, 常绿, 狭披针或披针形, 或长圆状椭圆形, 长 3—5 厘米, 宽 0.6—1.1 厘米, 先端渐尖, 稀钝, 基部向叶柄渐窄, 叶缘反卷, 上面深绿色, 下面淡绿色, 两面无毛, 中脉在上面凹入, 下面明显凸起, 侧脉 3—5 对, 两面均不明显, 或在上微凹入, 下面略凸起, 斜向上延伸; 叶柄长 3—5 毫米, 上面具浅沟, 无毛。圆锥花序顶生, 紧缩, 长 2—4 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米; 花序梗长 0.4—1.5 厘米, 被微柔毛, 密被皮孔; 苞片披针形, 长 1—1.8 毫米, 具睫毛; 花梗长 0—1 毫米; 花萼无毛, 长 1—1.5 毫米; 花冠长约 6 毫米, 花冠管长约 4 毫米, 裂片长圆形, 长约 1.5 毫米, 先端锐尖或钝, 盔状; 雄蕊着生于花冠管喉部, 花丝纤细, 长约 0.5 毫米, 花药长圆形, 长约 1.2 毫米, 与花冠裂片近等长; 花柱纤细, 长约 2.5 毫米, 柱头棒状。果未见。 花期 4—5 月。

产于广西、贵州。生山沟荫处, 海拔约 200 米。模式标本采自广西天峨。

21. 玉山女贞(台湾植物志)

Ligustrum morrisonense Kanehira & Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **21**: 147. 1931 Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 618, f. 574. 1936; Mori in Masamune, Short Fl. Formos. 169. 1936; Liu, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan **2**: 1068, f. 890. 1962; Shimizu & Kao in Acta Phytotax. Geobot. **20**: 68. 1962; Li, Woody Fl. Taiwan 761. 1963 et 台湾植物志 **4**: 143. 1978. — *L. delavayanum* Harriot subsp. *morrisonense* (Kanehira & Sasaki) Miao in Investigat. Stud. Nat. **6**: 94. 1986.

矮灌木, 稀呈匍匐状。小枝被灰色短柔毛。叶片宽卵形、长圆状卵形、椭圆形或近圆形, 长 0.7—2 厘米, 宽 0.5—1 厘米, 先端钝或圆, 基部楔形至圆形, 上面光亮, 两面无毛, 下面基部具短柔毛, 侧脉 1—3 对, 常不明显; 叶柄短, 长 0.5—3 毫米, 常被短柔毛。花 2—3 朵簇生于侧枝顶端, 稀单生; 花萼常被短柔毛, 长 2—3 毫米; 花冠长 8—10 毫米, 花冠管长 5—6.5 毫米, 裂片长 (2) 3—4 毫米, 锐尖; 雄蕊略短于花冠裂片, 花药长 2—3 毫米; 花柱长约 4 毫米, 柱头头状。果未见。 花期 4—7 月。

产于我国台湾。生海拔 1 000—1 800 米的砾石山脊上。模式标本采自台湾玉山。

22. 丽叶女贞 兴山蜡树(中国树木分类学), 乔皮子(甘肃), 苦丁茶(四川) 图版 45: 1—3

Ligustrum henryi Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 90. 1889; Diels in Bot. Jahrb. **29**: 533. 1900; Koehne in Ascherson-Festschr. 203. 1904; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **2**: 808. 1911; Höfk. in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **24**: 55, t. 6, f. b. 1915.