

var. *piliferum* P. Y. Bai in Acta Bot. Yunnan. 1: 155. 1979; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1):93. 1984; 西藏植物志 3: 892, 图 342, 1—3. 1986.

本变种的特点在于具小叶 3—5 枚, 较小, 顶生小叶片长 1—2.5 厘米, 宽 0.5—1.3 厘米, 侧生小叶片常近圆形, 有时为宽卵形和椭圆形, 长 0.6—1.5 厘米, 宽 6—10 毫米, 叶片两面、叶柄及花萼均被白色短伏毛。花期 6 月, 果期 8 月。

产于我国西藏。生山谷或高山林中, 海拔 2 600—2 650 米。模式标本采自我国西藏察隅。

15. 素馨花(桂海虞衡志) 图版 51:4

*Jasminum grandiflorum* Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1: 9. 1762; DC. Prodr. 8: 313. 1844; Ker in Bot. Reg. 2: t. 91. 1816; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 603. 1882; Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 13: 150. 1914 et Cat. Pl. Yun-Nan 179. 1916; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1:216. 1924; 陈嵘, 中国树木分类学 1033, 图 916. 1937; P. S. Green in Baileya 13: 146. 1965. — *J. officinale* L. var. *grandiflorum* (L.) Stokes, Bot. Comment 1:21. 1830. — *J. officinale* f. *grandiflorum* (L.) Kobuski in Journ. Arn. Arb. 13: 161. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 1013. 1936, “var.”; Rehd. Bibl. Cult. Trees & Shrubs 577. 1949. Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:37. 1952; 中国高等植物图鉴 3: 367. 1974, “var.”; 云南植物志 4:657. 1986; 西藏植物志 3:892. 1986.

攀援灌木, 高 2—4 米。小枝圆柱形, 具棱或沟。叶对生, 羽状深裂或具 5—9 小叶, 叶长 3—8 厘米, 宽 3—6 厘米; 叶轴常具窄翼, 叶柄长 0.5—4 厘米; 小叶片卵形或长卵形, 顶生小叶片常为窄菱形, 长 0.7—3.8 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米, 先端急尖、渐尖、钝或圆, 有时具短尖头、基部楔形、钝或圆。聚伞花序顶生或腋生, 有花 2—9 朵; 花序梗长 0—3 厘米; 苞片线形, 长 2—3 毫米; 花梗长 0.5—2.5 厘米, 花序中间之花的梗明显短于周围之花的梗; 花芳香; 花萼无毛, 裂片锥状线形, 长 (3—)5—10 毫米; 花冠白色, 高脚碟状, 花冠管长 1.3—2.5 厘米, 裂片多为 5 枚, 长圆形, 长 1.3—2.2 厘米, 宽 0.8—1.4 厘米。果未见。花期 8—10 月。

产于云南、四川、西藏及喜马拉雅地区。生石灰岩山地, 海拔约 1 800 米。世界各地广泛栽培。

本种花芳香而美丽, 常栽培供观赏。

16. 淡红素馨(植物分类学报) 钩良树(云南)

*Jasminum* × *stephanense* Lemoine in V. Lemoine & Son, Nancy, France, Cat. No. 195, 9. pl. 1921; Meunissier in Rev. Hort. Paris 1927: 644. 1927; Henry in Horticulture II. 8: 486. 1930; Kobuski in Journ. Arn. Arb. 13: 162. 1932; Chia in Acta Phytotax. Sin. 2:37. 1952; Miao in Bull. Bot. Res. 4(1): 101. 1984; 云南植物



1—3. 素方花 *Jasminum officinale* Linn. var. *officinale*, 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花冠展开。4. 素馨花 *J. grandiflorum* Linn., 花枝。5—6. 多花素馨 *J. polyanthum* Franch., 5. 花枝; 6. 花冠展开。(陆锦文绘)