

Strychnos axillaris Colebr. in Trans. Linn. Soc. 12: 356, tab. 15. 1819; Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. 1:101. 1856; C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4:89. 1883; Leenhouts in Fl. Malesiana Ser. 1, 6(2): 358, fig. 30g. 1962; Back. & Bakh. f. Fl. Java 2: 210. 1965; Tirel-Roudet in Fl. Camb. Laos Vietnam 13: 18, Pl. 3, 1—3. 1972.

木质藤本，长达 20 米，枝条被微柔毛至无毛；腋生枝刺顶端螺旋状卷曲。叶片纸质至革质，椭圆形、披针形、卵形至近圆形，长 2—10 厘米，宽 1—5 厘米，基部渐狭至近心形，上面仅中脉上被短柔毛，下面被短柔毛至无毛；基出脉 3—5 条；叶柄长达 1 厘米。二至三歧聚伞花序腋生或顶生，长 1—5 厘米，着花多朵，被短柔毛至无毛；花 5 数；花萼长 1—2 毫米，裂片卵形至近圆形，外面被短柔毛至无毛，内面无毛；花冠长 3—4 毫米，花冠管与花冠裂片等长或近等长，无毛或外面被微毛，花冠裂片长卵形，直立，厚，内面基部具一排直立的刺毛，刺毛长达花冠裂片的一半；雄蕊着生于花冠管中部，内藏，花丝极短，花药卵形，顶端具小尖头，基部具缘毛；雌蕊长 1.5—2 毫米，无毛，子房圆球状，直径 1 毫米。浆果卵圆状或圆球状，直径达 2 厘米，内有种子 1—2 颗；种子椭圆形或圆形，直径 6—12 毫米。花期 3—8 月，果期 6—12 月。

产于云南南部。生山地林中或林缘。分布于亚洲东南部，从印度经泰国至越南、老挝、柬埔寨经马来西亚到澳大利亚。

7. 华马钱(广西植物名录) 三脉马钱(海南植物志)，登欧梅罗(海南)，牛目椒(云南植物志)，百节藤(广西平南)

Strychnos cathayensis Merr. in Lingnan Sci. Journ. 13: 44. 1934; Chun in Sunyatsenia 4: 258, Pl. 42. 1940; Merr. & Chun in op. cit. 5:172. 1940; Tirel-Roudet in Fl. Camb. Laos Vietnam 13: 47. 1972; Bisset & al. in Lloydia 36(2): 182. 1973; 海南植物志 3:201. 1974; P. T. Li in Journ. South China Agr. Coll. 1: 125. 1980; 云南植物志 3: 441. 1983. —*Strychnos henryi* Merr. & Yamamoto ex Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agr. 7: 145. 1935; Li, Woody Fl. Taiwan 778. 1963; 台湾木本植物志 591. 1976; 台湾植物志 4:160. 1978.

7a 华马钱(原变种) 图版 61:8—12

var. *cathayensis*

木质藤本。幼枝被短柔毛，老枝被毛脱落；小枝常变态成为成对的螺旋状曲钩。叶片近革质，长椭圆形至窄长圆形，长 6—10 厘米，宽 2—4 厘米，顶端急尖至短渐尖，基部钝至圆，上面有光泽，无毛，下面通常无光泽而被疏柔毛；叶柄长 2—4 毫米，被疏柔毛至无毛。聚伞花序顶生或腋生，长 3—4 厘米，着花稠密；花序梗短，与花梗同被微毛；花 5 数，长 8—12 毫米；花梗长 2 毫米；小苞片卵状三角形，长约 1 毫米；花萼裂片卵形，长约 1 毫米，宽 0.5 毫米，外面被微毛；花冠白色，长约 1.2 厘米，无毛或有时外面有乳头状凸起，花冠管