

中。分布于泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等。模式标本采自菲律宾。

种子供药用。可解毒杀虫,主治中风、腹痛泻痢、小儿蛔虫及蛇虫咬伤等。有毒,须谨慎服用。

10. **长籽马钱**(全国中草药汇编) 尾叶马钱(云南植物志), 云南马钱(云南经济植物), 闹狗药(云南西畴、麻栗坡), 皮氏马钱(药学学报)

Strychnos wallichiana Steud. ex DC. Prodr. **9**:13. 1845; Bisset & Philcox in Taxon **20**: 543. 1971, Tirel-Roudet in Fl. Camb. Laos Vietnam **13**: 36, Pl. 7, 9—11. 1972; Bisset & al. in Lloydia **36**(2): 195. 1973; Pl. T. Li in Journ. South China Agr. Coll. **1**: 124. 1980; 云南植物志 **3**: 440. 1983, non Benth. 1856. — *Strychnos colubrina* Linn. Sp. Pl. **1**: 189. 1753, nom. confus. — *S. cirrhosa* Stokes in Bot. Mat. Med. **1**:414. 1812, nom. illeg. — *S. cinnamomifolia* Thw Enum. Pl. Zeyl. 201. 1860. — *S. rheedei* C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:87. 1883. — *S. bourdillonii* Brandis, Ind. Trees 474. 1906. — *S. gauthierana* Pierre ex Dop in Mem. Soc. Bot. France **19**: 17. 1910, pro part. — *S. tubiflora* Hill in Kew Bull. **1917**: 197. 1917. — *S. cinnamomifolia* Thw. var. *wightii* Hill in Kew Bull. **1917**: 194. 1917. — *S. pierriana* Hill in Kew Bull. **1917**: 197. 1917; Zhang & al. in Acta Pharm. Sin. **10**(6): 365, tab. 1. 1963; 云南经济植物 423, 图 307. 1972, nom. illeg. — *S. malaccensis* auct. non Benth.: C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:89. 1883.

木质藤本,长达 20 米。茎皮灰白色,有皱纹;小枝对生,圆柱形,光滑,常变态成为单生或成对的螺旋状曲钩。叶片纸质或近革质,椭圆形、倒卵形至近圆形,长 5—17 厘米,宽 3—5 厘米,顶端短渐尖或急尖,基部楔形或近圆;离基 3 出脉,横出网脉纤细;叶柄长 5—7 毫米。圆锥状聚伞花序顶生,长 4—5 厘米;花序梗及花梗被短柔毛;花 5 数;花萼裂片卵形,长 1—1.3 毫米,外面被微毛,边缘有睫毛;花冠黄白色,长 14 毫米,外面常有小乳头状凸起,花冠管长约 11 毫米,内面基部被长柔毛,花冠裂片长卵形,长约 4 毫米,顶端稍厚;雄蕊着生于花冠管顶端,花丝极短,花药长圆形,长约 1.5 毫米,顶端短尖或圆;雌蕊长 8 毫米,子房卵形,直径约 1 毫米,花柱伸长,柱头头状。浆果圆球状,直径 4—6 厘米,成熟时桔红色,果皮厚 2—3 毫米,内有种子多颗;种子扁,圆形、椭圆形或长圆形,长 2—3 厘米,表面密被浅灰棕色绢毛。花期 4—6 月,果期 8 月至翌年 1 月。

产于云南东南部。生海拔 600 米以下热带山地、山谷荫湿处或热带石灰岩地区沟谷阔叶林中。分布于印度、孟加拉国、斯里兰卡、越南及安达曼岛。模式标本采自孟加拉国。

种子、果皮、茎皮和叶均含有番木鳖碱和马钱子碱,其中以种子含量最高,叶含量最低,均有毒,可供药用。种子味苦性寒,有通经络、消肿、止疼痛之功效。