

长约 1 毫米,边缘具有腺毛。2—3 歧聚伞花序蝎尾状,顶生;花序梗长 1—2.5 厘米;花萼 5 深裂,长 1.5 毫米,花萼裂片三角形;花冠坛状,长 2—2.5 毫米,花冠管长 0.7—1.6 毫米,喉部密被长柔毛,花冠裂片卵状三角形,长 0.4—0.8 毫米,内面被长柔毛;雄蕊着生于花冠管内壁中部,花丝短,花药宽卵形,长约 0.5 毫米;子房圆球状,花柱极短或无,柱头 2 裂。蒴果中部以上或三分之二以上叉开,长和宽 3—3.5 毫米,裂瓣卵状三角形,顶端尖角伸直,基部有宿存花萼。花期 5—6 月,果期 6—7 月。

产于广西龙州等地。生石灰岩山地草丛中。越南也有。模式标本采自越南北部。

4. 大叶度量草 毛叶度量草 (中国高等植物图鉴) 图版 68:6—11.

Mitreola pedicellata Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. **1**: 91. 1856; C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **4**:79. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**:117. 1889; Hand -Mazz. Symb. Sin. **7**:946. 1936; Chun in Sunyatsenia **4**:258. 1940; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **32**:111. 112. 1972, **37**:143. 1978, **38**:454. 1980; 中国高等植物图鉴 **3**: 379, 图 4711. 1974; Chater in Hara & al., Enum. Fl. Pl. Nepal **3**:92. 1982; 云南植物志 **3**: 452, 图版 130, 7—10. 1983; 贵州植物志 **2**: 551, 图版 236, 1—2. 1985. — *Parophiorrhiza khasiana* C.B. Clarke ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**:85. 1880. — *Cynoctosum pedicellatum* (Benth.) Rob. in Proc. Amer. Acad. Arts Sci. **45**: 396. 1910; Leenhouts in Bull. Jard. Bot. Etat. Brux. **32**:417. 1962; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **32**:112. 1972. — *Omphalodes bodinieri* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **12**: 188. 1913. — *Ophiorrhiza darrisii* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **13**: 176. 1914. — *Mitreola bodinieri* (Lévl.) Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 262. 1914. — *M. darrisii* (Lévl.) Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 262. 1914. — *Trigonotis bodinieri* (Lévl.) Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 55. 1914. — *Ophiorrhiza marchandii* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **13**: 176. 1914.

多年生草本,高达 60 厘米。茎下部匍匐状;幼枝四棱形,老枝圆柱形;除幼叶下面、幼叶柄和花冠管喉部被短柔毛外,其余均无毛。叶片膜质至薄纸质,椭圆形、长椭圆形或披针形,有时倒披针形,长 5—15 厘米,宽 2—5 厘米,顶端渐尖至钝,基部楔形;侧脉每边 8—10 条;叶柄长 1—2 厘米;托叶退化或叶柄间成窄的叶鞘。三歧聚伞花序腋生或顶生,着花多朵;花序梗长 3—7 厘米;花梗长 1—3 毫米;苞片和小苞片披针形,长约 1 毫米;花萼 5 深裂,裂片卵状披针形,长约 1 毫米,宽 0.5 毫米,边缘膜质;花冠白色,坛状,花冠管长约 1.5 毫米,花冠裂片 5,卵形,长约 0.5 毫米;雄蕊 5,着生于花冠管近中部;子房近圆球形,光滑,花柱长 0.5 毫米,基部分离,柱头头状。蒴果近圆球状,直径 2—2.5 毫米,顶端有两尖角,基部有宿存花萼;种子圆球形,淡褐色,表面具小瘤状凸起。花期 3—5 月,果期 6—7 月。

产于湖北、广东、广西、四川、贵州和云南等省区。生海拔 400—2 100 米山地疏林下。

印度也有。模式标本采自印度。

2. 醉鱼草亚科——BUDDLEJOIDEAE Soler.

Soler. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 28, 44. 1892; Dalla Torre & Harms, Gen. Siphonog. 399. 1900—1907; P. T. Li in Journ. South China Agr. Coll. 3(1):18 1982. — *Buddlejaceae* Bartl. Ord. Nat. Pl. 172. 1830; Hutch. Fam. Fl. Pl. ed. 3, 463. 1973. — *Buddlejaceae* Wilhem, Samenpfl. 90. 1910; Hutch. Fam. Fl. Pl. 1:370. 1959; Melchior in Engl. Syll. Pflanzenfam. 2:447. 1964.

乔木、灌木或亚灌木；植株无内生韧皮部，常被星状毛、腺毛或鳞片。单叶对生、轮生，稀互生，全缘或有锯齿；羽状脉；叶柄短；托叶着生于两个叶柄基部之间呈叶状或缢缩成一连线。花单生或多朵组成聚伞花序，再排列成总状、穗状或圆锥状花序；花两性，辐射对称，4数；花萼裂片和花冠裂片覆瓦状排列；雄蕊着生于花冠管内壁上，花丝短，花药2室，稀4室，纵裂；子房上位，2室，稀4室，合生，每室有胚珠多颗。蒴果，2瓣裂，稀浆果，不开裂；种子多颗，通常有翅；胚乳肉质；胚直立。染色体基数 $x = 19$ 。

本亚科模式属：醉鱼草属 *Buddleja* Linn.

2族，约7属，150种，分布于热带至温带地区。我国产1族，1属，29种。

6. 醉鱼草族——Trib. BUDDLEJEAE

花药2室。其他特征与亚科相同。

8. 醉鱼草属*——*Buddleja* (*Buddleia* auct.) Linn.

Linn. Sp. Pl. 112. 1753; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 2:793. 1876; Soler. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2):46. 1892; Gagnep. Not. Syst. 2: 182. 1912; Marq. in Kew Bull. 1930: 177. 1930; Leenhouts in Fl. Malesiana Ser. 1, 6(2): 336. 1962; Lecuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-6: 5. 1979; Lecuwenberg & Leenhouts in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam 28b1: 67. 1980; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. 4(3):229. 1982.

多为灌木，少有乔木和亚灌木或亚灌木状草本；植株通常被腺毛、星状毛或叉状毛。枝

* 醉鱼草属(植物学大辞典)，白埔姜属(植物学名词审查本)