

宿存的花萼;种子卵形,无翅,具有小瘤状凸起。花期3—5月,果期6—10月。

产于四川和云南,生于海拔2000—2700米山地灌木丛中。模式标本采自云南西北部怒江边。

9. 腺叶醉鱼草(云南植物研究)

Buddleja delavayi Gagnep. in Not. Syst. 2: 190, 193. 1912; Marq. in Kew Bull. 1930: 197. 1930; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-6: 119. 1979, p. p. excl. syn. *B. heliophila* W. W. Smith & var. *angustifolia* Marq., var. *pubescens* Marq., var. *adenophora* Hand. -Mazz.; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. 4(3): 231. 1982. — *Buddleja glabrescens* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. 9: 85. 1916. — *B. delavayi* Gagnep. var. *tomentosa* Comber in Not. Bot. Gard. Edinb. 18: 230. 1934.

灌木或小乔木,高1—6米。茎圆柱形,多分枝,被星状毛;枝条细长,节稍膨大。叶对生,卵形、椭圆形或椭圆状披针形,长5—12厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖,基部渐狭下延至叶柄基部,两面具有小腺点,上面无毛,下面被星状柔毛,全缘;侧脉近平行,斜升至叶缘联结,上面不明显,下面明显;叶柄长5毫米。圆锥状聚伞花序顶生和腋生,长4—12厘米,宽3—7厘米;花序梗通常较长,被星状短绒毛;花梗长1—3毫米;苞片线形;花萼钟状,长3—4毫米,外面被星状疏柔毛,后变无毛,裂片钝三角形,长约1毫米;花冠紫蓝色,长11—16毫米,花冠管长9—13毫米,直径约1.5毫米,外面无毛,内面基部被星状疏柔毛,花冠裂片近圆形,长和宽2—3.5毫米,内面无毛;雄蕊着生于花冠管内壁中部略上,花丝短于花药3倍,花药卵状三角形,顶端急尖;子房卵形,无毛,花柱圆柱状,柱头膨大,顶端2裂。蒴果卵形,长5—10毫米,直径3—5毫米,无毛。花期1—3月,果期4—5月。

产于云南宾川、泸西和西藏墨脱、林芝等地。生海拔2000—3000米山地疏林中或山坡灌木丛中。模式标本采自云南宾川鸡足山。

10. 大花醉鱼草(云南植物研究) 尼泊尔醉鱼草(西藏植物志)

Buddleja colvilei Hook. f. & Thoms. in Hook. Illustr. Himal. Pl. tab. 18. 1855; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 81. 1883 et Curtis's Bot. Mag. 121: tab. 7449. 1895; Marq. in Kew Bull. 1930: 187. 1930; Yamazaki in Hara, Fl. East. Himal. 253. 1966, 2: 106. 1971; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-6: 103, fig. 26. 1979; Chatter in Hara & al., Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 89. 1982; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. 4(3): 232. 1982 et in Journ. South China Agr. Univ. 9(1): 51. 1988; 西藏植物志 3: 896. 1986. — *Buddleja sessilifolia* B. S. Sun ex S. Y. Pao in Fl. Yunnanica 3: 465, Pl. 134, 1—4. 1983.

灌木或小乔木,高2—6米。枝条近圆柱形,幼时被锈色星状短绒毛和腺毛,老渐无毛或近无毛。叶对生,叶片纸质,长圆形或椭圆状披针形,长7—16厘米,宽2—6厘米,顶端