

渐尖,基部圆、宽楔形至楔形,有时下延至叶柄基部,边缘具有细锯齿,幼时被星状短绒毛,下面较密,老渐近无毛;侧脉每边 15—20 条,上面扁平,干后凹陷,下面凸起;叶柄较短或几无柄。花较大,张开直径约 2 厘米,多朵组成腋上生和顶生的宽圆锥状聚伞花序,花序长 7—23 厘米,宽 4—6 厘米,被锈色星状柔毛;花序梗长 1—5 厘米;花梗短;苞片短小;小苞片线形,长 5 毫米;花萼钟状,长 6—8 毫米,宽 4—8 毫米,外面密被星状柔毛,内面无毛或有时有腺毛,花萼管长 4—5 毫米,花萼裂片卵状三角形,长和宽 1.5—3 毫米,全缘;花冠紫红色或深红色,长 2.3—3 厘米,花冠管圆筒状钟形,长 17—21 毫米,直径 6—8 毫米,喉部宽达 9 毫米,外面无毛,内面被柔毛,花冠裂片近圆形,长和宽 5—10 毫米,边缘浅波状;雄蕊着生于花冠管喉部,花丝短,花药长圆形,长 2.5—5 毫米,宽 1.3—2 毫米,顶端钝或突尖,基部心形;雌蕊长 18—22 毫米,子房卵形,约与花萼裂片等长,无毛或基部有时疏被星状毛,花柱丝状,柱头头状,2 裂,绿色。蒴果椭圆状,长 10—16 毫米,直径 6—8 毫米,初时被星状毛,后变无毛,基部有宿存花萼;种子长圆形,长 1—1.5 毫米,无翅。花期 6—9 月,果期 9—11 月。

产于云南墨江、泸西和西藏南部等地。生海拔 1 600—4 200 米山地疏林中或山坡灌木丛中。分布于印度、尼泊尔、锡金、不丹等地。模式标本采自锡金。

11. **大序醉鱼草**(云南植物研究) 长穗醉鱼草(云南植物志),白叶子(云南元江),羊巴巴叶(云南景东),锡金醉鱼草(西藏植物志)

Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Scroph. Ind. 42. 1835 et in DC. Prodr. 10: 447. 1846; C.B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 81. 1883; Soler. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 48. 1892; Gagnep. in Not. Syst. 2: 190. 1912; Rehd. & Wilson in Sarg. Pl. Wilson. 1: 572. 1913; Marq. in Kew Bull. 1930: 191. 1930; Kerr in Fl. Siam. Enum. 3(1): 54. 1951; Leeuwenberg, Vidal & Galibert in Fl. Camb. Laos Vietnam 13: 94, Pl. 15, 9—12. 1972; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 79-6: 133, fig. 35. 1979; Chater in Hara & al., Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 89. 1982; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. 4(3): 232. 1982; 云南植物志 3: 468. 1983. —*Buddleja martii* Schmidt in Journ. Bot. London 6: 245. 1868. —*B. hosseuiana* Kränzl. Ann. Naturh. Hofm. Wien. 26: 396. 1912. —*B. cylindrostachya* Kränzl. in Bot. Jahrb. 50, Beibl. 111: 46. 1913; Marq. in Kew Bull. 1930: 190. 1930. —*B. hancockii* Kränzl. in Bot. Jahrb. 50, Beibl. 111: 46. 1913. —*B. henryi* Rehd. & Wilson var. *hancockii* (Kränzl.) Marq. in Kew Bull. 1930: 192. 1930. —*B. hookeri* Marq. in Kew Bull. 1930: 191. 1930; 西藏植物志 3: 896, 图 346, 9—12. 1986.

11a. **大序醉鱼草**(原变种) 图版 75: 1—6

var. **macrostachya**