

15—25 厘米,宽 4—8 厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘锯齿三角形,上面淡绿色,无毛;中脉和侧脉在上面略凹陷,下面凸起;叶柄长约 1 厘米,幼时被毛,后变无毛。总状聚伞花序长 10—20 厘米,直径 1.5—2.5 厘米;花梗极短;苞片和小苞片钻形,长 2.5 毫米;花萼钟状,长约 3 毫米,花萼裂片三角形,长约 1 毫米;花冠紫色,花冠管长约 5 毫米,内壁上部被星状毛,花冠裂片近圆形,长和宽约 1 毫米,内面仅基部被柔毛;雄蕊着生于花冠管内壁的喉部,花丝极短,花药卵状长圆形,基部心形;子房卵形,长约 1 毫米,被星状毛,花柱圆柱状,长约 1 毫米,柱头棍棒状,长约 0.5 毫米。蒴果长圆形,长约 5 毫米,被疏星状毛,基部有宿存的花萼。花期 4—10 月,果期 6—12 月。

产于四川。生海拔 1 300—3 000 米山谷或山坡灌木丛中。模式标本采自四川西部。

13. 大理醉鱼草(云南植物研究)

Buddleja taliensis W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **9**: 87. 1916; Marq. in Kew Bull. **1930**: 188. 1930: Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 124. 1979, pro syn. sub *B. forrestii* Diels; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 233. 1982 et in Journ. South China Agr. Univ. **9**(1): 52. 1988; 云南植物志 **3**: 468, 图版 134, 5—8. 1983. — *Buddleja latiflora* S. Y. Pao in Fl. Yunnanica **3**: 473, Pl. 136, 1—3. 1983.

灌木,高 2—4 米。枝条幼时近四棱形,被星状短柔毛,老枝圆柱形,几无毛。叶对生,叶片纸质,披针形或长圆状披针形,长 7—17 厘米,宽 1.3—5.5 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形,边缘具细锯齿,上面被星状毛,中脉上毛被较密,老渐近无毛,下面密被星状短绒毛;中脉和侧脉上面扁平,干后凹陷,下面略凸起,侧脉每边 12—15 条;叶柄长 2—5 毫米,被星状短绒毛。圆锥状或总状聚伞花序顶生和腋生,长 4—6 厘米;小苞片、花梗、花萼和花冠的外面均被星状短绒毛;小苞片线状披针形,长约 5 毫米;花梗长 2—3 毫米;花萼钟状,长 3.5—6 毫米,内面无毛,花萼裂片狭三角形,长 1.5—2 毫米,萼片间的弯缺处呈圆形;花冠淡红色,后变淡黄色,长约 1.2 厘米,花冠管长 7—8 毫米,直径 3—4 毫米,外面毛被后变稀疏,内面中部以上被星状毛,花冠裂片近圆形,长和宽约 4 毫米,内面无毛;雄蕊着生于花冠管内壁中部以上而略近喉部,花丝短,花药卵状三角形,长约 1.5 毫米;子房长卵形或卵形,长 2.5—3.5 毫米,被星状毛,有时基部无毛,花柱长 4—5 毫米,柱头棍棒状,长 1.5—2.5 毫米。蒴果长卵形,长 6—7 毫米,直径 3—5 毫米,被疏星状毛,基部具宿存的花萼。花期 6—8 月,果期 9—11 月。

产于云南大理、腾冲、中甸等地。生海拔 2 000—3 200 米山地灌木丛中。模式标本采自云南大理。

14. 紫花醉鱼草(云南植物研究) 白叶花(云南丽江),拔白哥(云南白族语),蓝花密蒙花(云南药用植物名录) 图版 76:1—4

Buddleja fallowiana Balf. f. & W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**:15.