

和宽 1.5—3 毫米,内面仅基部被柔毛和小鳞片状腺体;雄蕊着生于花冠管近喉部,花丝极短,花药卵状长圆形,长 1.3—1.5 毫米,顶端到达花冠管喉部,基部心形;雌蕊 4—5 毫米,子房卵形,长 2.5—3 毫米,直径约 2 毫米,被星状毛,花柱长 1—1.5 毫米,无毛,柱头棍棒状,长约 1.5 毫米,不到达花药基部。蒴果长卵形,长 5—8 毫米,直径 3—3.5 毫米,被星状毛,成熟时 2 瓣裂,基部有宿存的花萼,顶端有时有宿存的花柱;种子纺锤形或长椭圆形,长 1—1.5 毫米,两端具长翅,翅披针形,长 2—2.5 毫米。花期 6—9 月,果期 10 月至翌年 2 月。

产于四川、云南、西藏。生海拔 750—3 600 米山地疏林中或山坡、山谷灌木丛中。模式标本采自四川峨边瓦山。

17. **滇川醉鱼草**(云南植物研究) 端丽醉鱼草(云南植物志), 苍山醉鱼草(云南种子植物名录)

Buddleja forrestii Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 249. 1912; Marq. in Kew Bull. **1930**: 188. 1930; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs 795. 1949; Bail. & al. Hort. Sec. 121. 1958; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 124, fig. 32. 1979, excl. syn. *B. taliensis* W. W. Smith; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 234. 1982; 云南植物志 **3**: 467. 1983. — *Buddleja longifolia* Gagnep. in Not. Syst. **11**: 191. 1912, nom. illeg., non Humb. Bonpl. & Kunth 1818. — *B. henryi* Rehd. & Wilson in Sarg. Pl. Wilson. **1**: 571. 1913; Marq. in Kew Bull. **1930**: 192. 1930. — *B. henryi* Kränzl. in Bot. Jahrb. **50**, Beibl. **111**: 44. 1913. — *B. cooperi* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**: 14. 1917. — *B. forrestii* Diels var. *gracilis* Lingelsh. in Fedde, Rep. Sp. Nov. Beih. **12**: 464. 1922. — *B. henryi* Rehd. & Wilson var. *glabrescens* Marq. in Kew Bull. **1930**: 192. 1930. — *B. pterocaulis* A. B. Jackson in Journ. Bot. **73**: 81. 1935. — *B. subherbacea* Keenan in Not. Bot. Gard. Edinb. **29**: 343, fig. 1—2. 1969.

灌木,高 2—5 米。枝条四棱形,棱上有翅;幼枝、叶片上面、叶柄和花序均被星状短绒毛,后变无毛或几无毛。叶对生,叶片薄纸质,披针形或长圆状披针形,稀倒披针形,长 10—20 厘米,宽 3—7.5 厘米,顶端渐尖,基部楔形,常下延至叶柄,边缘具细锯齿,叶下面被星状短绒毛,有时有金黄色腺点;侧脉每边 15—18 条,上面扁平,干后微凹陷,在下面稍凸起;叶柄长 5—10 毫米;叶柄间的托叶缢缩成线形的连结线。总状聚伞花序顶生兼腋生,长 12—20 厘米,直径约 3 厘米;花梗长 1—2 毫米;花萼和花冠的外面均疏被星状毛和腺毛;花萼钟状,长 4—5 毫米,花萼裂片狭披针形,长约 2 毫米,内面被疏柔毛,裂片间弯缺处呈圆形;花冠紫红色,花冠管长约 9 毫米,内面除基部无毛外均被星状柔毛,喉部毛被较密,花冠裂片近圆形,长和宽约 3.5 毫米,内面无毛;雄蕊着生于花冠管喉部,花丝极短,花药卵状长圆形,长 1.5—3 毫米,顶端达花冠裂片间弯缺处;子房卵状,长约 3 毫米,无

毛,花柱圆柱状,长约3毫米,无毛,柱头棍棒状,长约2毫米,顶端达花药基部。蒴果卵形或长卵形,长6—7毫米,直径3—4毫米,2瓣裂,无毛,基部有宿存花萼;种子长卵形,细,周围有翅。花期6—10月,果期7—12月。

产于四川和云南,生海拔1800—4000米山地疏林中或山坡灌木丛中。印度、不丹和缅甸北部也有。模式标本采自云南大理苍山。

18. 酒药花醉鱼草(云南植物研究) 多花醉鱼草(云南植物志) 图版78:1—3

Buddleja myriantha Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **5**: 250. 1912; Marq. in Kew Bull. **1930**: 203. 1930; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs 796. 1949; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 136, fig. 29. 1979, excl. syn. *B. adenantha* Diels; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 234. 1982; 云南植物志 **3**: 465, 图版133, 4—5. 1983, non Kränzl. 1913. — *Buddleja asiatica* Lour. var. *stipulara* Gagnep. in Not. Syst. **2**: 189. 1912, nom. nud. — *B. duclouxii* Marq. in Kew Bull. **1930**: 189. 1930; 西藏植物志 **3**: 896, 图343, 1—4. 1986。

灌木,高1—3米。枝条四棱形,棱上有翅,幼枝被星状短绒毛,老枝变无毛或毛被稀疏。叶对生,叶片纸质或薄纸质,披针形或长圆状披针形,长5—15厘米,宽1.5—4厘米,顶端长渐尖,基部楔形,下延至叶柄基部,嫩叶边缘具尖锯齿,老叶边缘锯齿较圆,上面深绿色,被星状毛和腺毛,下面淡绿色,密被星状短绒毛;侧脉每边7—12条,上面扁平,干后略凹陷,下面凸起;叶柄长达6毫米;叶柄间有1—2枚托叶,托叶宽心形或半圆形,长3—6毫米,宽5—9毫米,有时早落。总状或圆锥状聚伞花序,长10—27厘米,直径1—2.5厘米,通常3个顶生,被星状短绒毛;苞片和小苞片线状披针形;花萼钟状,长3—4毫米,外面被黄色星状短绒毛,内面无毛,花萼裂片披针形或线状披针形,长1.5—2毫米;花冠紫色,外面被星状短绒毛和腺毛,花冠管长5—6毫米,内面上部被长柔毛,花冠裂片宽卵形或近圆形,长约2毫米,宽约1.5毫米,内面无毛;雄蕊着生于花冠管喉部,花丝极短,花药长圆形,长0.8—1.2毫米,基部心形;子房卵形,长约1.5毫米,光滑无毛,花柱长1—1.5毫米,柱头棍棒状,长0.5—1毫米。蒴果长椭圆形,长4—6毫米,直径1—1.5毫米,无毛,有时基部有宿存的花萼;种子纺锤形,长2—2.5毫米,宽0.3—0.5毫米,两端具长翅。花期4—10月,果期6—12月。

产于甘肃、福建、湖南、广东、四川、贵州、云南和西藏等省区。生海拔450—3400米山地疏林中或山坡、山谷灌木丛中。缅甸也有。模式标本采自云南漾濞苍山西坡。

19. 巴东醉鱼草(中国高等植物图鉴) 白花醉鱼草(中国经济植物志) 图版78:4—6

Buddleja albiflora Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 118. 1889; Gagnep. in Not. Syst. **2**: 190. 1912; Rehd. & Wilson in Sarg. Pl. Wilson. **1**: 569. 1913; Marq. in Kew Bull. **1930**: 188. 1930; 中国高等植物图鉴 **3**: 371, 图4696. 1974; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 86, fig. 20. 1979; Z. Y. Zhang in