

Acta Phytotax. Sin. **18**(3): 354. 1980; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 235. 1982; 云南植物志 **3**: 467. 1983; 秦岭植物志 **1**(4): 100, tab. 95. 1983. — *Buddleja giraldii* Diels in Bot. Jahrb. **29**: 535. 1900; 秦岭植物志 **1**(4): 101. 1983. — *B. hemsleyana* Koehne in Gartenfl. **52**: 169. 1903. — *B. albiflora* Hemsl. var. *hemsleyana* (Koehne) Schneid. Ill. Handb. Laubh. **2**: 845, fig. 530 e. 1911. — *B. albiflora* Hemsl. var. *giraldii* (Diels) Rehd. & Wilson in Sarg. Pl. Wilson. **1**: 569. 1913. — *B. mairei* Lévl. f. *albiflora* Lévl. Cat. Pl. Yun-Nan 171. 1916. — *B. acutifolia* O. H. Wright f. *albiflora* (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 234. 1936. — *B. officinalis* Maxim. f. *albiflora* (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **18**: 276. 1937.

灌木, 高 1—3 米。枝条圆柱形或近圆柱形; 小枝、叶柄、花序、花萼外面和花冠外面均在幼时被星状毛和腺毛, 后变无毛。叶对生, 叶片纸质, 披针形、长圆状披针形或长椭圆形, 长 7—25 厘米, 宽 1.5—5 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 基部楔形或圆, 边缘具重锯齿, 上面深绿色, 近无毛, 下面被灰白色或淡黄色星状短绒毛; 侧脉每边 10—17 条, 上面扁平, 干后微凹, 下面略凸起; 叶柄长 2—15 毫米。圆锥状聚伞花序顶生, 长 7—25 厘米, 宽 2—5 厘米; 花梗短, 被长硬毛; 花萼钟状, 长 3—3.5 毫米, 内面无毛, 花萼管长约 2 毫米, 花萼裂片三角形, 长 1—1.5 毫米; 花冠淡紫色, 后变白色, 喉部橙黄色, 芳香, 长 6.5—8 毫米, 内面仅在花冠管内壁中部以上或喉部被长髯毛, 花冠管长约 5 毫米, 花冠裂片近圆形, 长 1—1.5 毫米; 雄蕊着生于花冠管喉部, 花丝极短, 花药长圆形, 长 0.6—1.3 毫米, 基部心形; 子房卵形, 长 1—1.5 毫米, 无毛, 花柱长 1—1.5 毫米, 无毛, 柱头棍棒状, 长 0.7—1 毫米。蒴果长圆状, 长 5—8 毫米, 直径 2—3 毫米, 无毛; 种子褐色, 条状梭形, 两端具长翅。花期 2—9 月, 果期 8—12 月。

产于陕西、甘肃、河南、湖北、湖南、四川、贵州和云南, 生海拔 500—2 800 米山地灌木丛中或林缘。模式标本采自湖北巴东。

20. 荻叶醉鱼草(全国中草药汇编)

Buddleja caryopteridifolia W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **8**: 179. 1914; Marq. in Kew Bull. **1930**: 200. 1930; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 947. 1936; Bail. & al. Hort. Sec. 121. 1958; 全国中草药汇编, 下册, 801. 1978; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 106. 1979, pro syn. sub *B. crispa* Benth.; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 235. 1982; 云南植物志 **3**: 462. 1983; 西藏植物志 **3**: 899. 1986. — *Buddleja inconpra* W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **8**: 180. 1914, non Linn. f. 1794. — *B. acosma* Marq. in Kew Bull. **1930**: 187. 1930, excl. specim. G. Forrest 16557 — *B. caryopteridifolia* W. W. Smith var. *lanuginosa* Marq. in Kew Bull. **1930**: 201. 1930.

20a. 荻叶醉鱼草(原变种) 图版 79: 1—3