

萼裂片披针形,长1—2毫米,膜质;花冠淡紫色,后变黄白色至白色,喉部橙黄色,芳香,长7.5—14毫米,外面被疏星状毛及鳞片,后变光滑无毛,花冠管细长,长6—11毫米,直径1—1.5毫米,内面被星状短柔毛,花冠裂片近圆形,长和宽1.5—3毫米,内面无毛,边缘全缘或具不整齐的齿;雄蕊着生于花冠管内壁中部,花丝短,花药长圆形,长0.8—1.2毫米,基部心形;子房卵形,长1.5—2毫米,直径约1毫米,无毛,花柱圆柱形,长0.5—1.5毫米,无毛,柱头棍棒状,长约1毫米。蒴果狭椭圆形或狭卵形,长5—9毫米,直径1.5—2毫米,2瓣裂,淡褐色,无毛,基部有宿存花萼;种子长椭圆形,长2—4毫米,直径约0.5毫米,两端具尖翅。花期5—10月,果期9—12月。

产于陕西、甘肃、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南和西藏等省区。生海拔800—3000米山坡、沟边灌木丛中。日本也有。马来西亚、印度尼西亚、美国及非洲有栽培。模式标本采自四川宝兴(穆坪)。

全株供药用,有祛风散寒、止咳、消积止痛之效。花可提制芳香油。枝条柔软多姿,花美丽而芳香,是优良的庭园观赏植物。

#### 25. 扁脉醉鱼草(云南植物研究) 有梗醉鱼草(云南植物志)

**Buddleja limitanea** W. W. Smith in Not. Bot. Gard. Edinb. **9**: 86. 1916; Marq. in Kew Bull. **1930**: 194. 1930; Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogeschool Wageningen **79-6**: 124. 1979, pro syn. sub *B. forrestii* Diels; P. T. Li in Acta Bot. Yunnan. **4**(3): 238. 1982; 云南植物志 **3**: 459, 图版 132, 4—5. 1983。

灌木,高1—3米。枝条圆柱形;幼枝、叶片上面、叶柄和花序均被星状柔毛,后变无毛。叶对生,叶片膜质至薄纸质,披针形或椭圆状披针形,稀倒披针形,长6—14厘米,宽2—5厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘具锯齿,上面深绿色,下面绿白色,密被星状短绒毛;侧脉每边8—12条,两面均扁平;叶柄长6—15毫米。总状聚伞花序,顶生和腋生,长5—10厘米,宽2—4厘米;花梗长2—3毫米;花萼钟状,长3—5毫米,两面无毛,花萼裂片三角形;花冠紫色,长约1厘米,花冠管圆筒状,长约8毫米,直径3—3.5毫米,外面无毛,内面被星状长柔毛,花冠裂片近圆形,长和宽约3毫米,外面初时被星状毛,后变无毛,内面无毛;雄蕊着生于花冠管内壁中部,花丝极短,花药卵形,长约2毫米;子房卵形,长约2—3毫米,无毛,花柱长约2毫米,柱头棍棒状,长约1毫米。蒴果卵形或椭圆形,长约1厘米,直径约5毫米,顶端常有宿存花柱。花期6—8月,果期8—10月。

产于云南的瑞丽、福贡、大理、永平、泸水、片马和西藏东南部。生海拔1800—3600米山坡或河旁灌木丛中或林缘。模式标本采自云南瑞丽怒江边。

本种相似滇川醉鱼草 *Buddleja forrestii* Diels, 惟本种枝条圆柱形,侧脉两面扁平,花萼外面和花冠外面均无毛,也无鳞片,雄蕊着生于花冠管内壁中部。而滇川醉鱼草的枝条四棱形,棱上具翅,侧脉下面凸起,花萼外面和花冠外面均被星状疏柔毛,也有鳞片,雄蕊着生于花冠管喉部等不同。