

紫黑色，内有 2 个盾形而具皱纹的种子；种子长约 5 毫米。花期 3—5 月，果期 10—12 月。

产于云南和贵州等省。生于沙地灌木丛中。印度、斯里兰卡、缅甸也有分布。模式标本采自印度。

本种植株外形与茜草科的虎刺 *Damnacanthus indicum* (L.) Gaertn. f. 很相似，为与虎刺区别，本种中名故称假虎刺。

3. 云南假虎刺(植物分类学报) 图版 3

Carissa yunnanensis Tsiang et P. T. Li in *Acta Phytotax. Sinica* **11:** 347, Pl. 36. 1973.

直立灌木，高 60 厘米；茎灰白色；小枝密被短柔毛，老枝无毛。刺腋生，单枝或顶端分叉，长 6—10 毫米。叶近革质，卵圆形，长 6—15 毫米，宽 3—5 毫米，两端急尖，无毛；中脉在叶面扁平，在叶背微凸起，侧脉不明显，纤细、每边 3—4 条；叶柄长 1—2 毫米，被短柔毛。聚伞花序腋生，着花 2—3 朵；花萼 5 深裂，双盖覆瓦状排列，裂片长卵圆形，长约 1 毫米，有缘毛；花冠白色，高脚碟状，长 1 厘米，花冠筒圆筒状，长 6 毫米，中部以上膨大，外面上部被微毛，内面在雄蕊着生处以下密被长柔毛，花冠裂片向右覆盖，卵状披针形，长 4 毫米，具缘毛；雄蕊在花冠筒的中部以上着生，花药长圆形，顶端到达花冠筒喉部；子房全缘，2 室，每室有胚珠单个，花柱长圆筒状，长 6 毫米，柱头长圆形，顶端被短柔毛，2 裂。花期 4 月。

产于云南。生于山地灌木丛中。模式标本采自鹤庆。

4. 大花假虎刺(中国高等植物图鉴)

Carissa macrocarpa (Eckl.) DC. Prodr. **8:** 336. 1844; Backer et Bakh. f. Fl. Java **3:** 655. 1968; 中国高等植物图鉴, **3:** 416, 图 4786. 1974. — *Arduina macrocarpa* Eckl. S. Afr. Journ. **1:** 372. 1830. — *Arduina grandiflora* E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 190. — *Carissa grandiflora* (E. Mey.) DC. l. c. 335; 侯宽昭等, 广州植物志, 489, 图 270. 1956; Backer et Bakh. f. l. c. **2:** 222. 1965.

直立灌木；枝近无毛；刺两叉状，长 2—4 厘米。叶革质，广卵形，长 3—7 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，顶端具急尖而有小尖头，基部浑圆或钝，无毛；叶背中脉凸起，侧脉扁平而不明显，无毛；叶柄长约 2 毫米。聚伞花序顶生，花冠高脚碟状，白色，芳香，长达 2.7 厘米；花萼短，5 裂，裂片披针形，长约 5.5 毫米，宽 2 毫米，无毛，内面基部具腺体；花冠裂片长圆形，向左覆盖，长约为花冠筒的 2 倍，外面无毛，内面密被柔毛；雄蕊 5 枚，着生于花冠筒中部略上；子房全缘，2 室，每室有胚珠 10 颗，花柱长圆柱状，柱

头比雄蕊为高,顶端2裂,被毛。浆果卵圆形至椭圆形,长2—5厘米,亮红色;种子圆形,纸质,红色。花期8月。

原产于南非洲 Natal 地方,我国引进栽培于广东。世界热带和亚热带地区也有栽培。

本种花大,芳香,供庭园观赏。浆果较大,在南非洲 Natal 地区人民将半熟的果制果酱,成熟的果做饼馅。

2. 仔榄树属*——*Hunteria* Roxb.

Roxb. Hort. Beng. 84. 1814, et Fl. Ind. 1: 695. 1832.

乔木,具乳汁。叶对生,革质,具柄,羽状脉;侧脉密生而近平行。近圆锥状或伞房状的聚伞花序顶生或腋生;花萼小,5裂,内面无腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,花冠喉部膨大,裂片5,在花蕾时向左覆盖;雄蕊5枚,着生在花冠筒中部以上,花丝短,花药长圆状披针形,内藏,与柱头分离,基部圆,顶端钝;无花盘;子房由2枚离生或基部合生的心皮组成,花柱丝状,柱头圆锥状,顶端浅2裂;每心皮有胚珠2—4颗,着生在子房腹缝线胎座上。浆果2,卵形或球形,肉质,内有种子1—2颗;子叶卵圆形,胚根在上。

约8种,分布于印度尼西亚、马来西亚、越南、缅甸、印度、刚果和安哥拉等。我国产1种,仅见于广东海南。

本属模式种为: *Hunteria zeylanica* (Retz.) Gard. ex Thw.

仔榄树(海南植物志) 黄羊(广东海南);洪达木(俗称) 图版4

Hunteria zeylanica (Retz.) Gard. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 191. 1860; Alston, Suppl. Handb. Fl. Ceylon 190. 1931; Tsiang in Sunyatsenia 3: 134. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 417, 图4787. 1974; 海南植物志, 3: 227, 图676. 1974. ——*Cameraria zeylanica* Retz. Obs. Bot. 4: 24. 1786. ——*Hunteria corymbosa* Roxb. Fl. Ind. 1: 695. 1832; Tsiang l. c. 2: 103. 1934.

乔木,高达8米,胸径10—26厘米;树皮灰褐色;枝条灰绿色,无毛,含乳汁。叶对生,近革质,长圆形,长圆状披针形或卵状长圆形,长9—16厘米,宽2.5—5厘米,顶端短渐尖,钝头,基部宽楔形,两面无毛;中脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉两面扁平,纤细,密生几平行,每边40条以上;叶柄长1—1.5厘米。花白色,芳香,直径约1

* 仔榄树属(中国植物科属检索表),别名洪达木属(中国种子植物科属辞典)。