

2. 萝芙木族——Trib. Rauvolfieae (K. Schum.) Woodson

Woodson in Ann. Miss. Bot. Gard. 17: 10. 1930.——Subtrib.

Rauwolfinae K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4,

2: 122. 1895.

花萼裂片内面无腺体;花冠高脚碟状;花盘通常全缘;子房具2个心皮,离生或合生;果为核果,离生或合生。

本族我国产6属。

5. 海杧果属*——*Cerbera* Linn.

Linn. Sp. Pl. 208. 1753.

乔木,具乳汁。叶螺旋状互生,具柄,羽状脉,无毛。花白色,喉部红色或黄色;花多朵集成顶生的聚伞花序,具长总花梗;花萼5深裂,内面基部无腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,具棱,喉部膨大,具被短柔毛鳞片5枚,基部缩小,花冠裂片5,在花蕾时向左覆盖;雄蕊5枚着生在花冠筒喉部,花丝短,花药内藏,与柱头分离,卵圆形,顶端短尖,基部圆;无花盘;子房由2枚离生心皮组成,花柱丝状,柱头球形,基部环状,顶端2裂;每心皮有胚珠4颗。核果2个,离生或单个,阔卵圆状或球状,外果皮纤维质或木质,内有种子1—2颗;无胚乳,子叶薄或厚,肉质,胚根很短。

约9种,分布于亚洲热带和亚热带地区及澳大利亚,马达加斯加及亚洲太平洋沿岸为多。我国产1种,分布于南部海岸。

本属模式种为: *Cerbera manghas* Linn.

海杧果(种子植物名称) 黄金茄、牛金茄、牛心荔、黄金调、山杧果(广东海南);香军树(广东);山样子、猴欢喜(台湾) 图版 11

Cerbera manghas Linn. Sp. Pl. 208. 1753; Tsiang in Sunyatsenia 2: 114. 1934, op. cit. 3: 137. 1936; 陈嵘,中国树木分类学, 1079, 插图 966. 1937; 侯宽昭等,广州植物志, 487, 插图 268. 1956; 中国高等植物图鉴, 3: 420, 图 4793. 1974; 海南植物志, 3: 228, 图 677. 1974.

乔木,高4—8米,胸径6—20厘米;树皮灰褐色;枝条粗厚,绿色,具不明显皮孔,无毛;全株具丰富乳汁。叶厚纸质,倒卵状长圆形或倒卵状披针形,稀长圆形,顶端钝

* 海杧果属(种子植物名称),别名海檬果属(植物分类学报);山样子属(中国树木分类学)。