

离;无花盘;子房2室,2深裂,每室有胚珠2个。核果的内果皮木质,坚硬,2室,每室有种子2个。

约15种,产于热带非洲和热带美洲,现全世界热带及亚热带地区均有栽培。我国栽培2种,1栽培变种。

本属模式种为: *Thevetia ahouai* (L.) A. DC.

分 种 检 索 表

- 1. 叶倒卵状长圆形;花冠筒比花冠裂片长…………… 1. 阔叶竹桃 *T. ahouai* (L.) A. DC.
- 1. 叶线形或线状披针形;花冠筒比花冠裂片短。
 - 2. 花冠黄色…………… 2. 黄花夹竹桃 *T. peruviana* (Pers.) K. Schum.
 - 2. 花冠红色…………… 2a. 红酒杯花 *T. peruviana* (Pers.) K. Schum. cv. *Aurantiaca*

1. 阔叶竹桃(新拟)

Thevetia ahouai (L.) A. DC. Prodr. 8: 345. Mar 1844; Tsiang in Sunyatsenia 3: 134. 1936. — *Cerbera ahouai* Linn. Sp. Pl. 208. 1753.

常绿灌木或小乔木,高3米,木质部有臭味,乳汁有毒。叶倒卵状长圆形,顶端钝,基部渐尖,叶面无毛,叶背被短微毛。聚伞花序顶生,着花多朵;花萼裂片卵圆形,顶端急尖,反折,无毛;花冠黄色,外面无毛,花冠筒具5稜,比花冠裂片长,内面喉部具5个被毛鳞片,花冠裂片卵圆形,边缘波状;雄蕊着生花冠筒的上部,花药内藏,花丝短;花柱伸长,柱头陀螺状,顶端2裂。花期几乎全年。

广东南部岛屿栽培。原产巴西。

全株有毒,尤以种子和乳汁毒性很大。

2. 黄花夹竹桃(植物学名词审查本) 黄花状元竹(广东潮汕):酒杯花(广东广州);柳木子(广西) 图版12

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam 4, 2: 159. 1895; Tsiang in Sunyatsenia 3: 134. 1936; 侯宽昭等,广州植物志, 487, 插图 269. 1956; 裴鉴等,中国药用植物志,第七册,图版394. 1965; 中国高等植物图鉴, 3: 420, 图 4794. 1974; 海南植物志, 3: 232, 图 680. 1974. — *Cerbera thevetia* Linn. Sp. Pl. 209. 1753. — *Cerbera peruviana* Pers. Syn. 1: 267. 1805. — *Thevetia nereifolia* Juss. ex Steud. Nom. ed. 2(2): 680. 1841. — *Thevetia nereifolia* Juss. ex A. DC. Prodr. 8: 343. 1844. — *Thevetia linearis* A. DC. op. cit. 354. — *Thevetia thevetia* Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. 2: 83. 1900.