

8. 蕊木属*——*Kopsia* Bl.

Bl. Catal. Buitenzorg 12. 1823.

乔木或灌木，具白色乳汁。叶对生，羽状脉。聚伞花序顶生，着花2—3朵或多朵；总花梗和花梗通常具苞片；花萼5深裂，裂片双盖覆瓦状排列，裂片内面基部无腺体；花冠高脚碟状，白色或红色，花冠筒细长，顶端裂片向右覆盖；雄蕊着生在花冠筒中部以上，花药长圆状披针形或卵圆形，顶部不伸出花冠喉部之外，基部圆形，花丝短；花盘舌状，2枚，与子房互生；子房上位，由2枚离生心皮所组成，每心皮有胚珠2颗，花柱细长，柱头增厚。核果双生，倒卵形或椭圆形，内有种子1—2颗；种子长圆形。

约30种，分布于印度、泰国、越南、老挝、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾。我国产3种，1栽培种；分布于广东、广西和云南等省区。

本属模式种为：*Kopsia arborea* Bl.

分种检索表

- 乔木；花盘比心皮长。
2. 叶卵状长圆形；苞片、萼片两面被柔毛；花盘匙形……………1. 蕊木 *K. lancibracteolata* Merr.
2. 叶椭圆状长圆形；苞片、萼片两面无毛；花盘线状披针形……………2. 云南蕊木 *K. officinalis* Tsiang et P. T. Li
1. 灌木；花盘比心皮短或等长。
3. 花冠白色；子房无毛；花萼两面无毛……………3. 海南蕊木 *K. hainanensis* Tsiang
3. 花冠粉红色；子房被柔毛；花萼两面被短柔毛……………4. 红花蕊木 *K. fruticosa* (Ker) A. DC.

1. 蕊木(广东) 假乌榄树(广东儋县) 图版14

Kopsia lancibracteolata Merr. in Philip. Journ. Sci. **23**: 262. 1923, et in Lingnan Sci. Journ. **5**: 150. 1927; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 111. 1934; 中国高等植物图鉴, **3**: 421, 图 4796. 1974; 海南植物志, **3**: 231. 1974.

乔木，高达15米；枝条无毛，淡绿色。叶革质，卵状长圆形，长8—22厘米，宽4—8.5厘米，两面无毛，略具光泽，顶端急尖，基部阔楔形；侧脉每边10—18条，明显；叶柄长5—7毫米。聚伞花序顶生，长约7厘米；苞片长7毫米，披针形，渐尖，两面被灰色微毛；花萼裂片长圆状披针形，长4—6毫米，宽2毫米，边缘有缘毛，两面被微

* 蕊木属(海南植物志)，别名柯蒲木属(植物分类学报)。