

植株作药用民间有用来治高血压、白带、淋浊、月经不调、疝气、喉痛。叶外敷治恶疮溃疡。

10. 云南萝芙木(广东林学院研究报告) 勒毒、辣多(傣语) 图版 20

Rauvolfia yunnanensis Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:11, 图版 6. 1962; 中国高等植物图鉴, 3:425, 图 4804. 1974.

灌木, 除花冠筒内面被长柔毛外, 其余皆无毛; 茎麦秆色或灰白色, 被稀疏的皮孔; 节间长 1—5 厘米。叶膜质, 椭圆形或披针状椭圆形, 先端长渐尖, 基部楔形, 长 6—20 厘米, 宽 1.5—9 厘米; 中脉在叶面微凹, 在叶背凸起, 侧脉两面明显, 12—17 对, 不伸至叶缘; 叶柄长约 1 厘米。聚伞花序, 花稠密多达 150 朵; 总花梗 4—9 条, 从上部小枝的腋间生出, 长 2—7 厘米; 花萼钟状, 裂片 5 枚; 花冠白色, 花冠筒长约 12.5 毫米, 中央膨大, 内面密被长柔毛, 裂片广卵形, 长宽约相等; 雄蕊着生于花冠筒膨大处, 花药背部着生; 花盘环状, 高达子房的一半; 子房由 2 个离生心皮所组成, 花柱圆柱状, 柱头棒状, 基部具一环状薄膜。核果红色, 扁平, 椭圆形, 长约 1 厘米, 直径 5 毫米。花期 3—12 月, 果期 5 月—翌年春季。

分布于云南、贵州和广西等省区。生于海拔 900—1300 米山地灌木丛中或山地密林荫处及溪旁湿润肥沃地方。模式标本采自云南西双版纳。

根供药用, 有治疥癣。根含生物硷有降低血压效用。

11. 风湿木(广西) 阔叶萝芙木(广东林学院研究报告) 图版 21

Rauvolfia latifrons Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:13, 图版 8. 1962; 中国高等植物图鉴, 3:426, 图 4805. 1974.

灌木, 高 1—2 米, 除花冠筒内被柔毛外, 全株无毛; 茎土灰色, 被稀疏皮孔。叶薄纸质, 对生或三叶轮生, 广卵形, 先端急尖或短渐尖, 基部楔形, 长 4.5—24.5 厘米, 宽 2—12.5 厘米; 中脉在叶面扁平, 在叶背略凸起, 侧脉 13—15 对, 平曲上升至边缘处联结; 叶柄平伸, 长 1—1.5 厘米。聚伞花序广散腋生, 长 11 厘米, 幅宽 21 厘米; 花梗粗壮, 第一级总花梗长 3—6 厘米, 第二级总花梗长 3—4.5 厘米, 第三级总花梗长 1—1.5 厘米; 花梗上被稀疏皮孔; 花萼钟状, 裂片卵圆形, 长 1 毫米; 花冠白色, 冠筒圆筒状, 中间膨大, 直径 2 毫米, 内被柔毛, 裂片卵圆形, 长 1 毫米; 雄蕊着生于花冠筒中部膨大处, 花药背部着生; 花盘环状, 高 1 毫米, 为子房之半; 子房一半埋藏在花盘内, 高 1 毫米, 花柱柔弱, 长 6.5 毫米, 柱头棒状, 基部具一环状薄膜。核果红色, 离生, 椭圆形, 长 1 厘米, 宽 7 毫米。花期 5—8 月, 果期 7—12 月。

产于广西西南部。生于海拔 300—800 米山地水沟边、路旁灌木丛中或丘陵山谷



图版 20 云南萝芙木 *Rauvolfia yunnanensis* Tsiang, 1.花枝; 2.花蕾; 3.花冠展开, 示雄蕊着生。(杨可四仿绘)