

植株作药用民间有用来治高血压、白带、淋浊、月经不调、疝气、喉痛。叶外敷治恶疮溃疡。

10. 云南萝芙木(广东林学院研究报告) 勒毒、辣多(傣语) 图版 20

**Rauvolfia yunnanensis** Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:11, 图版 6. 1962; 中国高等植物图鉴, 3:425, 图 4804. 1974.

灌木, 除花冠筒内面被长柔毛外, 其余皆无毛; 茎麦秆色或灰白色, 被稀疏的皮孔; 节间长 1—5 厘米。叶膜质, 椭圆形或披针状椭圆形, 先端长渐尖, 基部楔形, 长 6—20 厘米, 宽 1.5—9 厘米; 中脉在叶面微凹, 在叶背凸起, 侧脉两面明显, 12—17 对, 不伸至叶缘; 叶柄长约 1 厘米。聚伞花序, 花稠密多达 150 朵; 总花梗 4—9 条, 从上部小枝的腋间生出, 长 2—7 厘米; 花萼钟状, 裂片 5 枚; 花冠白色, 花冠筒长约 12.5 毫米, 中央膨大, 内面密被长柔毛, 裂片广卵形, 长宽约相等; 雄蕊着生于花冠筒膨大处, 花药背部着生; 花盘环状, 高达子房的一半; 子房由 2 个离生心皮所组成, 花柱圆柱状, 柱头棒状, 基部具一环状薄膜。核果红色, 扁平, 椭圆形, 长约 1 厘米, 直径 5 毫米。花期 3—12 月, 果期 5 月—翌年春季。

分布于云南、贵州和广西等省区。生于海拔 900—1300 米山地灌木丛中或山地密林荫处及溪旁湿润肥沃地方。模式标本采自云南西双版纳。


根供药用, 有治疥癣。根含生物硷有降低血压效用。

11. 风湿木(广西) 阔叶萝芙木(广东林学院研究报告) 图版 21

**Rauvolfia latifrons** Tsiang, 广东林学院研究报告, 1:13, 图版 8. 1962; 中国高等植物图鉴, 3:426, 图 4805. 1974.

灌木, 高 1—2 米, 除花冠筒内被柔毛外, 全株无毛; 茎土灰色, 被稀疏皮孔。叶薄纸质, 对生或三叶轮生, 广卵形, 先端急尖或短渐尖, 基部楔形, 长 4.5—24.5 厘米, 宽 2—12.5 厘米; 中脉在叶面扁平, 在叶背略凸起, 侧脉 13—15 对, 平曲上升至边缘处联结; 叶柄平伸, 长 1—1.5 厘米。聚伞花序广散腋生, 长 11 厘米, 幅宽 21 厘米; 花梗粗壮, 第一级总花梗长 3—6 厘米, 第二级总花梗长 3—4.5 厘米, 第三级总花梗长 1—1.5 厘米; 花梗上被稀疏皮孔; 花萼钟状, 裂片卵圆形, 长 1 毫米; 花冠白色, 冠筒圆筒状, 中间膨大, 直径 2 毫米, 内被柔毛, 裂片卵圆形, 长 1 毫米; 雄蕊着生于花冠筒中部膨大处, 花药背部着生; 花盘环状, 高 1 毫米, 为子房之半; 子房一半埋藏在花盘内, 高 1 毫米, 花柱柔弱, 长 6.5 毫米, 柱头棒状, 基部具一环状薄膜。核果红色, 离生, 椭圆形, 长 1 厘米, 宽 7 毫米。花期 5—8 月, 果期 7—12 月。

产于广西西南部。生于海拔 300—800 米山地水沟边、路旁灌木丛中或丘陵山谷



图版 21 风湿木 *Rauvolfia latifrons* Tsiang, 1.花枝; 2.花; 3.花冠展开,示雄蕊和雌蕊。  
(杨可四仿绘)

密林石上;广东南部有栽培。模式标本采自广西睦边。

根、茎供药用,广西民间有用来治风湿、接骨。

## 12. 苏门答腊萝芙木(中国高等植物图鉴)

**Rauvolfia sumatrana** Jack in Malay. Misc. 1(5): 22. 1820; Roxb. Fl. Ind. 2: 543. 1824; A. DC. Prodr. 8: 337. 1844.

乔木,高达10米。叶近革质,3—4枚轮生,长圆形或椭圆状长圆形,长12—20厘米,宽4—8厘米,顶端短渐尖,基部宽楔形,两面无毛;中脉在叶面凹陷,在叶背略凸起,侧脉纤细,密生几平行,与中脉近垂直,每边30—45条;叶柄长2—3厘米。伞形状聚伞花序3—6个顶生;花序梗长5—8厘米;花小,白色,花冠长6毫米,直径2毫米,花冠筒喉部被长柔毛;子房由2枚离生心皮组成,每室有胚珠2个;花盘5裂,围绕子房基部。核果长圆状圆球形,外果皮具皱纹;种子1—2个。花期3—5月,果期秋冬季。

广东南部栽培。产于印度尼西亚、马来西亚等地。模式标本采自印度尼西亚苏门答腊。

木材坚硬,在国外有用作刀剑鞘。

## 10. 链珠藤属\*——*Alyxia* Banks ex R. Br.

Banks ex R. Br. Prodr. 496. Apr. 1810.

藤状灌木,具乳汁。叶对生,或3—4枚轮生。花小;总状式聚伞花序,具小苞片;花萼5深裂,花萼内无腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒状,顶部稍收缩,喉部无鳞片;花冠裂片5枚,向左覆盖;雄蕊5枚,着生在花冠筒中部之上,花药内藏;无花盘;子房为2枚离生心皮组成;花柱丝状,柱头头状,顶端2裂或全缘;每心皮有胚珠4—6颗,2排。核果,卵形或长椭圆形,通常连结成链珠状,稀单生或对生。

约112种,分布于亚洲南部及太平洋群岛。我国产18种,分布于西南及华南各省区。

本属模式种为: *Alyxia spicata* R. Br.

## 分种检索表

### 1. 叶无毛。

\*链珠藤属(海南植物志),别名念珠藤属(种子植物名称);阿莉藤属(中国树木分类学)。