

密林石上;广东南部有栽培。模式标本采自广西睦边。

根、茎供药用,广西民间有用来治风湿、接骨。

12. 苏门答腊萝芙木(中国高等植物图鉴)

Rauvolfia sumatrana Jack in Malay. Misc. 1(5): 22. 1820; Roxb. Fl. Ind. 2: 543. 1824; A. DC. Prodr. 8: 337. 1844.

乔木,高达10米。叶近革质,3—4枚轮生,长圆形或椭圆状长圆形,长12—20厘米,宽4—8厘米,顶端短渐尖,基部宽楔形,两面无毛;中脉在叶面凹陷,在叶背略凸起,侧脉纤细,密生几平行,与中脉近垂直,每边30—45条;叶柄长2—3厘米。伞形状聚伞花序3—6个顶生;花序梗长5—8厘米;花小,白色,花冠长6毫米,直径2毫米,花冠筒喉部被长柔毛;子房由2枚离生心皮组成,每室有胚珠2个;花盘5裂,围绕子房基部。核果长圆状圆球形,外果皮具皱纹;种子1—2个。花期3—5月,果期秋冬季。

广东南部栽培。产于印度尼西亚、马来西亚等地。模式标本采自印度尼西亚苏门答腊。

木材坚硬,在国外有用作刀剑鞘。

10. 链珠藤属*——*Alyxia* Banks ex R. Br.

Banks ex R. Br. Prodr. 496. Apr. 1810.

藤状灌木,具乳汁。叶对生,或3—4枚轮生。花小;总状式聚伞花序,具小苞片;花萼5深裂,花萼内无腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒状,顶部稍收缩,喉部无鳞片;花冠裂片5枚,向左覆盖;雄蕊5枚,着生在花冠筒中部之上,花药内藏;无花盘;子房为2枚离生心皮组成;花柱丝状,柱头头状,顶端2裂或全缘;每心皮有胚珠4—6颗,2排。核果,卵形或长椭圆形,通常连结成链珠状,稀单生或对生。

约112种,分布于亚洲南部及太平洋群岛。我国产18种,分布于西南及华南各省区。

本属模式种为: *Alyxia spicata* R. Br.

分种检索表

1. 叶无毛。

*链珠藤属(海南植物志),别名念珠藤属(种子植物名称);阿莉藤属(中国树木分类学)。