

12. 叶纸质, 边缘不反卷。

16. 花冠筒内面无毛。

17. 叶常披白霜; 侧脉在叶背不明显……………

…………… 14. 卫矛叶链珠藤 *A. euonymifolia* Tsiang

17. 叶深绿色; 侧脉在叶背明显……………

…………… 15. 海南链珠藤 *A. hainanensis* Merr. et Chun

16. 花冠筒内面被短柔毛。

18. 花全长10毫米; 雄蕊着生于花冠筒中部; 柱头顶端无毛, 2裂……………

…………… 16. 茉莉链珠藤 *A. jasminea* Tsiang et P. T. Li

18. 花全长6毫米以下; 雄蕊着生于花冠筒喉部; 柱头顶端被长柔毛, 全缘…

…………… 17. 串珠子 *A. vulgaris* Tsiang

1. 叶背密被短柔毛…………… 18. 毛叶链珠藤 *A. villilimba* C. Y. Wu. ex Tsiang et P. T. Li

1. 橄榄果链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia balansae Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chin. 3: 1120. 1933.

藤状灌木, 除花序具微柔毛外余皆无毛; 嫩枝压扁有纵条, 老时圆形; 茎皮苍白色, 具小瘤。叶在枝端3—4叶轮生, 在枝的下部为对生, 长圆状椭圆形, 长9—18.5厘米, 宽3—4厘米, 两端渐尖或基部宽楔形; 中脉在叶面凹下, 在叶背凸起, 侧脉多数; 叶柄长1—1.5厘米。聚伞花序腋生, 长8—10厘米; 花萼裂片卵圆形, 长1毫米, 急尖, 有缘毛; 花冠黄色, 花冠筒长2毫米, 花冠裂片广椭圆形, 长1毫米; 雄蕊着生于花冠筒喉部之下, 而隐藏在內; 子房为2个心皮组成, 离生, 具长柔毛, 胚珠4个, 2排, 花柱细长, 柱头圆锥形。核果长圆形, 长4.2厘米, 直径1.5厘米, 两端钝。花期夏季, 果期秋冬季。

产于云南南部。生于海拔760—930米山谷疏林中。越南也有。模式标本采自越南。

2. 勐龙链珠藤(植物分类学报)

Alyxia menglungensis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 364, Pl. 44. 1973.

木质藤本, 除幼嫩部分和花序外其余无毛; 枝直径4毫米, 小枝苍白色或灰白色, 节间长4—14厘米, 直径约2毫米, 具瘤状突起。叶纸质, 对生至3叶轮生, 椭圆形至长圆状椭圆形, 长9—11厘米, 宽3—4厘米(最大的长达12厘米, 宽达4.2厘米); 中脉在叶面微凹, 在叶背凸起, 侧脉多数, 在叶面明显, 在叶背不明显; 叶柄长约1厘米。聚伞花序伞形状, 1—4个顶生或腋生, 长2—6.7厘米, 被浅灰色短柔毛, 每个花序着花15—20朵; 花序梗长2.5—5.5厘米; 苞片、小苞片和花萼均密被浅灰色短柔毛, 苞片、小苞片与萼片同形; 花萼5深裂, 长圆状卵圆形, 长2毫米, 宽1毫米, 先端钝, 外面被