

毛，花柱丝状，柱头圆形。果序腋生，长达 5 厘米；核果椭圆形，长 20 毫米，直径 12 毫米，具细尖头及短柄，在中间紧缩。 花期 5 月。

产于我国台湾。模式标本采自台湾兰屿。

5. 乐东链珠藤(植物分类学报)

Alyxia lehtungensis Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 30. Pl. 7. 1965; 海南植物志, **3**: 227. 1974.

攀援灌木，除花外其余均无毛；小枝具稜，老枝圆柱状，有稀少皮孔。叶近革质，对生，倒卵形，长 4—7.7 厘米，宽 2—3.5 厘米，顶端钝，基部宽楔形，叶面深绿色，干时黑褐色，叶背浅绿色；中脉在叶面凹陷，在叶背凸起，侧脉不明显。花小，2—3 朵组成聚伞花序；花梗长 1—2 毫米，被疏柔毛；苞片卵圆形；萼片外面无毛，边缘有稀疏短柔毛，长卵圆形，长 2 毫米，宽 0.8 毫米；花冠高脚碟状，花冠裂片向左覆盖，长卵圆形，长 1.5 毫米，宽 1 毫米，花冠筒圆筒形，在雄蕊着生处膨大，内面被短柔毛，长 3 毫米，宽 1.5 毫米；雄蕊着生在花冠筒的中部，花丝短；雌蕊长 1.5 毫米，子房密被短柔毛，花柱圆柱状，柱头长圆形，顶端全缘，被毛。核果长卵圆形，长约 1.5 厘米，直径约 0.7 厘米。 花期 3—5 月，果期 6—8 月。


产于广东海南。生于山腰密林中。模式标本采自海南乐东番阳洞。

6. 链珠藤(中国高等植物图鉴) 阿利藤(中国树木分类学)；满山香、鸡骨香、过山香、春根藤(广东)；过滑边、山红来、瓜子英(福建)，瓜子藤(广东、广西) 图版 22

Alyxia sinensis Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. **4**: 334. 1852; Benth. Fl. Hongkong. 219. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **24**: 95. 1889; Dunn et Tatcher in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 168. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 149. 1927; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 104. 1934; 中国高等植物图鉴, **3**: 426, 图 4806. 1974.

藤状灌木，具乳汁，高达 3 米；除花梗、苞片及萼片外，其余无毛。叶革质，对生或 3 枚轮生，通常圆形或卵圆形、倒卵形，顶端圆或微凹，长 1.5—3.5 厘米，宽 8—20 毫米，边缘反卷；侧脉不明显；叶柄长 2 毫米。聚伞花序腋生或近顶生；总花梗长不及 1.5 厘米，被微毛；花小，长 5—6 毫米；小苞片与萼片均有微毛；花萼裂片卵圆形，近钝头，长 1.5 毫米，内面无腺体；花冠先淡红色后退变白色，花冠筒长 2.3 毫米，内面无毛，近花冠喉部紧缩，喉部无鳞片，花冠裂片卵圆形，长 1.5 厘米；雌蕊长 1.5 毫米，子房具长柔毛。核果卵形，长约 1 厘米，直径 0.5 厘米，2—3 颗组成链珠状。 花期 4—9 月，果期 5—11 月。

图版 22



图版 22 链珠藤 *Alyxia sinensis* Champ. ex Benth., 1.花枝; 2.花蕾; 3.花冠一部分, 展示雄蕊着生; 4.雌蕊; 5.核果。(吴翠云绘)

分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、贵州等省区。常野生于矮林或灌木丛中。模式标本采自广东南部岛屿。

根有小毒，具有解热镇痛、消痛解毒作用。民间常用于治风火、齿痛、风湿性关节痛、胃痛和跌打损伤等。全株可作发酵药。

7. 貴州鏈珠藤(植物分类学报)

Alyxia kweichowensis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 360, Pl. 41. 1973.

攀援灌木，除花序外其余无毛；小枝粉绿色，具小瘤状凸起，节间长2—2.5厘米；老枝灰色，节间长3.5—6.5厘米；叶腋内或腋间具小腺体，腺体黑色，钻状，长约0.5毫米。叶坚纸质，对生，稀3叶轮生，椭圆形，稀为椭圆状长圆形，长3.5—6厘米，宽1—2.6厘米，两端均短渐尖，钝头，叶缘波状；中脉在叶面微凹，在叶背凸起，侧脉在叶面明显，在叶背不明显；叶柄长2—3毫米。聚伞花序腋生，单个，二歧或三歧；花序梗长5—20毫米，被灰色长柔毛；小苞片2枚或更多，生在花萼的下部；花萼5深裂，裂片双盖覆瓦状排列，长圆状披针形，长2.5—3毫米，宽1毫米，外面被灰色长柔毛，有缘毛，内面基部无腺体；花冠绿白色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，在中部以上膨大，长3毫米，花冠裂片向左覆盖，广椭圆形，长1.5毫米，宽1.2毫米，顶端近圆形；雄蕊着生于花冠筒中部以上，花药长圆形，药室基部圆形；子房由2枚离生心皮组成，被长柔毛，花柱圆柱状，柱头顶端2裂，被短柔毛；胚珠4个，2排。核果球状椭圆形，长1.3厘米，直径8毫米，顶端急尖。花期7月，果期10月。

产于贵州平塘、册亨。生于海拔350米疏林中。模式标本采自平塘。

8. 陷边链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia marginata Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chin. 3: 1123. 1933; 中国高等植物图鉴 3: 840. 1974.

攀援灌木，高1—2米，除花序外其余皆无毛；小枝和枝条暗灰色或黑色，具瘤状凸起；幼嫩小枝的节间长2.5—4.5厘米，老枝的节间长2.5—5厘米。叶对生或3枚轮生，椭圆状披针形，长7—10厘米，宽1.4—2.8厘米，顶端渐尖，基部楔尖，沿叶的边缘有一条下陷的沟；中脉在叶面微凹，在叶背凸起，侧脉多数，在叶面明显，在叶背不明显；叶柄长3—4毫米。花序腋生，长约1厘米，花1—4朵集成伞形花序；小苞片多数而着生在花梗的基部；花萼外面被短柔毛，裂片卵圆形，急尖，长约3毫米，宽与长相等；花冠黄白色，花冠筒长5毫米，内被稠密的短柔毛，裂片卵圆形，长3毫米，宽2.5毫米；雄蕊着生在冠筒中部以上；子房被毛，花柱圆筒状，柱头头状，顶部被毛。核果单