

采自广东鼎湖山。

茎、叶作药用,民间有治消肿、止痛、抽筋、风湿等。

11. 尖叶链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia acutifolia Tsiang in Sunyatsenia 3: 135. 1936.

攀援灌木,高2米,全株无毛;树茎皮灰白色;小枝方形,节间长2—2.5厘米。叶革质,对生,在嫩枝的上部为4叶轮生,上升,长圆状披针形或椭圆形,长4—6厘米,宽1.2—2厘米,叶面暗绿色,叶背浅绿色,顶端急尖,基部渐狭而下延至叶柄成楔形,边缘向背面卷;中脉在叶面微凹,在叶背微凸,侧脉不明显;叶柄长约5毫米。花未见。核果单生或2个而成节,圆球形,长约1厘米,直径1厘米,灰白色。花期3—8月,果期9月—翌年5月。

产于广东。生于山地林中。模式标本采自信宜。

12. 长花链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia forbesii King et Gamble in Journ. As. Soc. Beng. 74 (2): 420. 1908; Ridley, Fl. Mal. Penins. 2: 334. 1923; Tsiang in Sunyatsenia 3: 136. 1936, 静生汇报, 9: 16. 1939.

蔓延木质藤本,除花序外均无毛;幼嫩的小枝具三稜,老枝成圆柱状;茎皮灰白色,具稀少皮孔;节间长5—8.5厘米。叶坚纸质,对生或3—4叶轮生,披针形,长8—11厘米,宽1.5—2.5厘米,顶端长渐尖,基部楔形,边缘微向背面反卷;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面明显,在叶背不明显;叶柄长3—5毫米。聚伞花序腋生,长3—5厘米,着花5—6朵;总花梗长1—1.3厘米,被灰色长柔毛;小苞片少数,被灰色长柔毛,与花萼裂片同形;花萼裂片卵圆状披针形,长2毫米,宽1毫米,顶部钝,被灰色长柔毛;花冠黄白色,高脚碟状,花冠筒圆筒状,在雄蕊着生处膨大,喉部紧缩,长8.5毫米,裂片卵圆形,钝头,长4毫米,宽2毫米;雄蕊着生于花冠筒中部之上;雌蕊长8毫米,子房被长柔毛,花柱细长,柱头无毛,顶端2裂。核果长圆状椭圆形,长1.5厘米,直径约0.5厘米。花期5—8月,果期8—10月。

产于云南南部。生于海拔1300米的山谷中。分布于马来西亚和印度尼西亚。模式标本采自马来西亚。

13. 狭叶链珠藤(中国高等植物图鉴)

Alyxia schlechteri Lév. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 453. 1911; Woodson in Journ. Arn. Arb. 15: 316. 1934; Tsiang in Sunyatsenia 2: 105. 1934, op. cit. 3: 136. 1936; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 235. 1937. — *Daphne bodinieri* Lév. l.