

c. **13**: 258. 1914.——*Wikstroemia bodinieri* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 417. 1915.——*Alyxia bodinieri* Woodson, l. c. **15**: 316. 1934.

蔓延木质藤本，具乳汁，除幼嫩部分和花序外均无毛；小枝被微柔毛，老时渐成无毛，具稠密皮孔；老枝灰白色，直径 1.3 毫米；节间幼嫩时长 1—7 厘米。叶近革质，对生或 3—4 叶轮生，常集在小枝的上部，狭披针形或狭椭圆形，长 2—4 厘米，宽 7—13 毫米（最大的 6×1.5 厘米），顶端渐尖或急尖，基部宽楔形，叶面深绿色，叶背浅绿色，边缘微向外卷；中脉在叶面凹陷，在叶背凸出，侧脉在叶面略可看见，在叶背不明显而光滑；叶柄长 2—4 毫米。花黄色，多朵集成聚伞花序，长 0.5—1 厘米，腋生。核果链珠状，具 2—3 个节，椭圆形，长 7 毫米，直径 5 毫米，紫黑色。果期 12 月至翌年 5 月。

产于贵州、云南及广西等省区。生于海拔 700—1150 米山地疏林中或灌木丛中。模式标本采自贵州。

14. 卫矛叶链珠藤(植物分类学报)

Alyxia euonymifolia Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 28. Pl. 5. 1965; 海南植物志, **3**: 226. 1974.


攀援灌木，除总花梗、小苞片和萼片被微柔毛外，其余均无毛；小枝四棱，老枝圆柱状，有稀少皮孔。叶近革质，在枝上部为 3 叶轮生，在枝下部则为对生，椭圆形，长 2—4 厘米，宽 1—2 厘米（最大者达 6×2.2 厘米），顶端急尖，基部楔形，上面具白霜，下面浅绿色；中脉两面凸起，侧脉不明显；叶柄长 5—8 毫米。花小，组成聚伞花序，顶生或腋生，长约 1 厘米；花萼 5 深裂，萼片卵圆形，钝头，被柔毛，边缘被缘毛，长 1.8 毫米，宽 1.5 毫米；花冠红黄色，高脚碟状，花冠筒圆筒状，长 2.6 毫米，内面无毛，喉部紧缩，在雄蕊着生处膨大，花冠裂片卵圆形，长 1 毫米，宽 0.8 毫米；雄蕊着生在冠筒中部以上，花药长圆形；子房被柔毛；花柱丝状；柱头顶端 2 裂。核果黑紫色，球状椭圆形，长 1.2 厘米，直径 0.8 厘米。花期 6—9 月，果期 8—12 月。

产于广东海南。生于海拔 300 米处的林中。模式标本采自海南保亭。

15. 海南链珠藤(海南植物志) 白骨藤(海南) 图版 23(6—9)

Alyxia hainanensis Merr. et Chun in Sunyatsenia **2**: 309, fig. 41. 1935; Tsiang op. cit. **3**: 136. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 428, 图 4809. 1974; 海南植物志, **3**: 226, 图 675. 1974.

攀援灌木，除花序外其余均无毛；小枝压扁或方形后成圆形，具稀少皮孔，直径 2—4 毫米；节间长 3—6 厘米（在果枝上可达 16 厘米）。叶对生或 3 叶轮生，坚纸质，



图版 23 1—5. 串珠子 *Alyxia vulgaris* Tsiang, 1.花枝; 2.花蕾; 3.花冠一部分,展开示雄蕊着生位置; 4.雌蕊; 5.核果。6—9. 海南链珠藤 *Alyxia hainanensis* Merr. et Chun, 6.花蕾; 7.花冠展开示雄蕊着生位置; 8.雌蕊; 9.核果。(吴翠云仿绘)

椭圆形至长圆形,顶端渐尖,稀钝头,基部急尖或近圆形,边缘微向外卷,长4—12厘米,宽2.5—4.5厘米;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉多数,在叶面可见,在叶背不明显;叶柄长3—8毫米。花序腋生或近顶生的花束,或集成短圆锥式的聚伞花序,长1—2厘米;总花梗、花梗、小苞片被灰色短柔毛;花萼裂片长圆状披针形,被短柔毛,具缘毛,长1.8毫米;花冠黄绿色,两面无毛,花冠筒圆筒状,在上端膨大,在花喉处收缩,长3.8毫米,裂片卵圆形,钝头,长1.8毫米,宽1.4毫米;雄蕊着生于花冠筒上部膨大的地方;子房具2个分离的心皮,被疏长柔毛,长1.6毫米,花柱丝状,柱头无毛,顶端2裂。核果近球形,通常长圆状椭圆形,有时弯曲,通常具1—3个关节,长9—22毫米,直径5—7毫米。花期8—10月,果期12月—翌年4月。

产于广东、广西、四川等省区。生于海拔250—950米山地疏林下或山谷、路旁较荫湿的地方。模式标本采自广东崖县。

16. 茉莉链珠藤(植物分类学报)

Alyxia jasmineea Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 362, Pl. 43. 1973.

攀援灌木,除小枝和花序外其余无毛;小枝压扁状,被微柔毛,后脱落成无毛,节间长2—3厘米。叶椭圆形或椭圆状长圆形,长2—7厘米,宽1—2厘米,顶端渐尖,基部楔形,边缘微向外卷;中脉在叶面微凹,在叶背稍凸起,侧脉在叶的两面均不明显;叶柄长约5毫米。聚伞花序生于小枝顶端的叶腋内,长1.5—2厘米,着花2—3朵;花序梗长3毫米;小苞片被微柔毛,与花萼裂片同形;花萼裂片卵圆形,顶端尖,长1.7毫米,外被微柔毛,边缘具缘毛;花冠高脚碟状,长10毫米,花冠筒长6毫米,外面无毛,内面被长柔毛,花冠裂片长卵形,长4毫米,宽3.2毫米;雄蕊着生于花冠筒的中部,花药卵状披针形,长1.6毫米;子房被疏柔毛,花柱丝状,柱头顶端2裂,基部膨大。核果椭圆形,长约1.3厘米,直径6毫米。花期8—10月,果期10—12月。

产于云南南部。生于海拔1940米山地密林潮湿处。模式标本采自云南屏边。

17. 串珠子(植物分类学报) 图版23(1—5)

Alyxia vulgaris Tsiang in Acta Phytotax. Sinica **10**: 29. Pl. 6. 1965; 中国高等植物图鉴, **3**:428, 图4810. 1974; 海南植物志, **3**:227. 1974.

蔓延藤状灌木;小枝具稠密的皮孔,老时枝条具稀瘤;节间长1.5—4厘米。叶对生或3叶轮生,厚坚纸质,椭圆形或长圆形至椭圆状披针形,长3—7厘米,宽1.3厘米(最大者达7.7×4.1厘米),顶端急尖稀短渐尖,叶面深绿色,叶背浅绿色;叶面中脉和侧脉扁平,叶背中脉凸起,侧脉微隆起;叶柄长0.3—1厘米。花小,淡黄绿色,组