

花冠筒漏斗状,花冠裂片倒卵形,长12毫米,宽7毫米,先端圆形;雄蕊着生于花冠筒中部之下,花丝短而扁平,花药的顶端有毛;子房由2个心皮所组成。蓇葖长约5厘米。花期3—5月。

我国江苏、浙江和台湾等省栽培。原产欧洲。

1a. 花叶蔓长春花(中国高等植物图鉴)

Vinca major Linn. cv. **Variegata**——*Vinca major* var. *variegata* Loud.; Bail. Man. Cult. Pl. 812. 1949; 中国高等植物图鉴 3:430. 1974

叶的边缘白色,有黄白色斑点。

栽培于江苏等省。

2. 小蔓长春花(中国高等植物图鉴)

Vinca minor Linn. Sp. Pl. 209. 1753; 中国高等植物图鉴 3:840. 1974

蔓性多年生草本,具有直立的花茎,全株无毛。叶长圆形至卵圆形,长1—3.5厘米,宽0.7—1.7厘米。花梗长1—1.5厘米;花长约1厘米,直径约1.5厘米;花萼5裂;花冠漏斗状,花冠筒比花萼长,花冠裂片斜倒卵形;雄蕊5枚,着生于花冠筒的中部之下,花丝扁平,比花药长,花药顶端具有一丛毛的膜;花盘舌状;子房由2枚离生心皮所组成,花柱端部膨大,柱头有毛,基部有一增厚的环状圆盘。蓇葖2个,直立。花期5月。

江苏等省有栽培。原产欧洲。

5. 鸡骨常山族——Trib. *Alstonieae* G. Don

G. Don, Gen. Hist. 4: 70. 1837.

果为蓇葖果;种子盾形,有缘毛,缘毛在两端略长。

本族我国产2属。

16. 鸡骨常山属*——*Alstonia* R. Br.

R. Br. Mem. Wern. Soc. 1: 75. Apr. 1810.

乔木、灌木,具乳汁;枝轮生。叶通常为3—4(—8)片轮生,稀对生;侧脉多数,密生而平行。花白色、黄色或红色,由多朵花组成伞房状的聚伞花序,顶生或近顶生;花萼短,萼片为双盖覆瓦状排列,内面无腺体;花冠高脚碟状,冠筒圆筒形,中部以上膨

* 鸡骨常山属(种子植物名称),别名鸭脚树属(植物分类学报)。