

为我国特有种，产于云南、贵州和四川。生于海拔 700—1500 米的山地疏林下岩石上。模式标本采自云南。

根、叶捣碎民间用来治刀伤出血和治疮毒。

6. 黄花羊角拗(植物分类学报)

Alstonia henryi Tsiang in Sunyatsenia 6: 112, Pl. 20, fig. 6. 1941; Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 369. 1973.—*A. sebusi* (van Huerck et Muell.-Arg.) Monachino var. *szemaoensis* Monachino in Pacific Sci. 3: 157. 1949.

直立灌木，高达 2.5 米，除花外其余无毛；枝条轮生，密被灰白色的皮孔；叶腋内外具丛生钻状褐色腺体。叶纸质，3—4 片轮生，集于小枝的顶端，叶片披针形，顶端渐尖，基部楔形，长 5—11 厘米，宽 1—2.5 厘米，两面无毛；侧脉密生，每边 40—65 条，近平行，脉距 1—1.5 毫米；叶柄长 0.5—1.2 厘米。花黄色，多朵组成顶生三歧聚伞花序；总花梗长 2—3 厘米；花梗长 0.8—1.2 厘米；萼片卵圆形，顶端急尖，长 1 毫米，被缘毛；花冠高脚碟状，花冠筒粗短，长约 8 毫米，宽 2 毫米，近喉部膨大，内面仅中部以上密被长柔毛，裂片广卵形，长 1—2 毫米；花药长圆形，长 2 毫米，花丝短，着生在花冠筒近喉部；子房高约 2 毫米，心皮离生，胚珠多数，花柱长约 5 毫米，柱头卵圆状长圆形，顶端 2 裂；花盘由 2 枚舌状鳞片组成，与心皮互生，和子房等长。花期 6 月。

为我国特有种，产于云南。生于海拔 1500 米的山地林中。模式标本采自思茅。

17. 盆架树属*——*Winchia* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 326. 1844.

常绿乔木，具乳汁；枝轮生。叶对生至轮生；侧脉纤细而密生，几平行。聚伞花序顶生，着花多朵；花萼 5 裂，短，裂片双盖覆瓦状排列，内面基部无腺体；花冠高脚碟状，花冠筒圆筒形，中部膨大，内面喉部被柔毛，花冠裂片在花蕾时向左覆盖；雄蕊与柱头离生，着生于花冠筒中部，花药披针形，顶端不伸出花冠喉之外；无花盘；子房由 2 枚合生心皮组成，每心皮有胚珠多数，花柱丝状，柱头棍棒状，顶端 2 裂。蓇葖合生，种子两端被缘毛。

2 种。分布于印度、缅甸、越南和印度尼西亚等。我国产 1 种。

本属模式种为：*Winchia calophylla* A. DC.

盆架树(海南植物志) 岭刀柄、灯架、山苦常、鸭脚常、阿斯通木、粉叶鸭脚树、白

*盆架树属(海南植物志)。