

花喉之外。蓇葖合生,木质,圆柱形,向端部渐尖,长达16厘米,直径4厘米,外果皮灰色,有不规则的细条纹,内果皮黄色;种子长圆形,棕褐色,具皱纹,长1.5厘米,宽3毫米;种毛白色绢质,长4厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

产于广东海南。多生于疏林中,攀援于大树上。模式标本采自黎母岭。

叶及乳汁有毒,误食能致命。

3. 广西清明花(中国高等植物图鉴)

Beaumontia pitardii Tsiang in Sunyatsenia 2: 160. 1934. — *B. campanulata* Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1235. 1933, non K. Schum. (1895).

木质大藤本,有时爬行地上,其幼嫩部分包含枝、叶柄、总花梗、花梗,小苞片及萼片均被橙红色短绒毛,老时渐变为灰褐色。叶长圆形或倒披针形,顶端渐尖,具一小尖头,长10—13厘米,宽6—7厘米(最大的18×8厘米);中脉凹陷,侧脉每边12—14条,斜升,与网脉略凸起;叶柄上面有凹槽。聚伞花序伞房状,近顶生或腋生,主轴长2.5—4厘米,不分歧,着花5—8朵;小苞片长12毫米,早落;花梗2—2.5厘米;萼片长圆状披针形或倒披针形,锐尖,长18—20毫米,宽4—5毫米,内面有一排腺体;花冠外面白色,里面紫色,长约10—12厘米,宽约5厘米,花冠筒长8—10厘米,裂片长和宽均约2厘米;花丝长约3.5厘米;花盘5裂或为环状,顶端有5个浅裂片;子房为2个合生心皮所组成,花柱长6厘米,有柔毛。花期3—5月。

产于广西南部。多生于山地山谷密林中或疏林中,攀援大树上。越南也有。模式标本采自越南河内。

4. 思茅清明花(中国高等植物图鉴)

Beaumontia murtonii Craib in Kew Bull. 282. 1914; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1239. 1933; 蒋英,静生汇报, 9: 27. 1939. — *Beaumontia* sp. nov. Craib l. c. 415. 1911.

攀援藤本;小枝幼时有锈色柔毛,老时无毛,茎上具有皮孔。叶长圆形或长圆状倒披针形,顶端短渐尖,长17—20厘米,宽6.5—7.5厘米,叶面被微毛,老时无毛,叶背被浓短柔毛;侧脉12—16对,弧形上升不到边缘就网结,侧脉远离,近平行;叶柄长1—2厘米。圆锥状花序顶生,长13厘米;花梗长4厘米;花萼裂片长圆状披针形,渐尖,长4厘米,宽1.5厘米,两面均被微毛;花冠筒圆筒状,长约2厘米,外面有绒毛,冠檐长和宽约5厘米,在端部两面均有微毛;花丝长3.5厘米,花药长1.3厘米;子房与花盘等长,被浓锈毛,花柱基部具微毛。蓇葖大,木质,合生,长圆状圆柱形,顶端钝,长14厘米,直径3厘米,外果皮深灰色,具皱纹,内果皮深褐色;种子披针形,长2