

花喉之外。蓇葖合生,木质,圆柱形,向端部渐尖,长达16厘米,直径4厘米,外果皮灰色,有不规则的细条纹,内果皮黄色;种子长圆形,棕褐色,具皱纹,长1.5厘米,宽3毫米;种毛白色绢质,长4厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

产于广东海南。多生于疏林中,攀援于大树上。模式标本采自黎母岭。

叶及乳汁有毒,误食能致命。

3. 广西清明花(中国高等植物图鉴)

Beaumontia pitardii Tsiang in Sunyatsenia 2: 160. 1934. — *B. campanulata* Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1235. 1933, non K. Schum. (1895).

木质大藤本,有时爬行地上,其幼嫩部分包含枝、叶柄、总花梗、花梗,小苞片及萼片均被橙红色短绒毛,老时渐变为灰褐色。叶长圆形或倒披针形,顶端渐尖,具一小尖头,长10—13厘米,宽6—7厘米(最大的18×8厘米);中脉凹陷,侧脉每边12—14条,斜升,与网脉略凸起;叶柄上面有凹槽。聚伞花序伞房状,近顶生或腋生,主轴长2.5—4厘米,不分歧,着花5—8朵;小苞片长12毫米,早落;花梗2—2.5厘米;萼片长圆状披针形或倒披针形,锐尖,长18—20毫米,宽4—5毫米,内面有一排腺体;花冠外面白色,里面紫色,长约10—12厘米,宽约5厘米,花冠筒长8—10厘米,裂片长和宽均约2厘米;花丝长约3.5厘米;花盘5裂或为环状,顶端有5个浅裂片;子房为2个合生心皮所组成,花柱长6厘米,有柔毛。花期3—5月。

产于广西南部。多生于山地山谷密林中或疏林中,攀援大树上。越南也有。模式标本采自越南河内。

4. 思茅清明花(中国高等植物图鉴)

Beaumontia murtonii Craib in Kew Bull. 282. 1914; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1239. 1933; 蒋英,静生汇报, 9: 27. 1939. — *Beaumontia* sp. nov. Craib l. c. 415. 1911.

攀援藤本;小枝幼时有锈色柔毛,老时无毛,茎上具有皮孔。叶长圆形或长圆状倒披针形,顶端短渐尖,长17—20厘米,宽6.5—7.5厘米,叶面被微毛,老时无毛,叶背被浓短柔毛;侧脉12—16对,弧形上升不到边缘就网结,侧脉远离,近平行;叶柄长1—2厘米。圆锥状花序顶生,长13厘米;花梗长4厘米;花萼裂片长圆状披针形,渐尖,长4厘米,宽1.5厘米,两面均被微毛;花冠筒圆筒状,长约2厘米,外面有绒毛,冠檐长和宽约5厘米,在端部两面均有微毛;花丝长3.5厘米,花药长1.3厘米;子房与花盘等长,被浓锈毛,花柱基部具微毛。蓇葖大,木质,合生,长圆状圆柱形,顶端钝,长14厘米,直径3厘米,外果皮深灰色,具皱纹,内果皮深褐色;种子披针形,长2

厘米,宽5毫米;种毛白色绢质,长2.5厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

产于云南南部。生于杂木林中。泰国、越南也有分布。模式标本采自泰国。

5. 清明花 炮弹果(广西);刹抢龙(云南少数民族名)

Beaumontia grandiflora Wall. Tent. Fl. Nep. 15, t. 7. 1824; Lindl. in Bot. Reg. 11: 911. 1825; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 60: 3213. 1833; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 660. 1882; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1238. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 2: 160. 1934, A. Henry 11950 excl.——*Echites grandiflora* Roxb. Hort. Beng. 20. 1814, nomen, et Fl. Ind. Carey ed. 2: 14. 1832, descr.

高大藤本;枝幼时有锈色柔毛,老时无毛、茎有皮孔。叶长圆状倒卵形,长6—15厘米,宽3—8厘米,顶端短渐尖,幼时略被柔毛,老渐无毛,稀叶背被浓毛;侧脉约15对;叶柄长2厘米。聚伞花序顶生,着花3—5朵,有时更多;花梗有锈色柔毛,长2—4厘米;花萼裂片长圆状披针形或倒卵形,或倒披针形,长2.5—4厘米;花冠长约10厘米,外面有微毛,裂片卵圆形;雄蕊着生于花冠筒的喉部,花药箭头状。蓇葖形状多变,内果皮亮黄色;种子长约2厘米;种毛白色绢质,长4厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

云南野生,生于山地林中;广西、广东和福建有栽培。印度也有。模式标本采自印度。

根和叶供药用,可治风湿性腰腿痛、骨折、跌打损伤等。

23. 倒缙木属*——*Paravallaris* Pierre ex Hua

Pierre ex Hua in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. 1: 30. 1898.

灌木或小乔木。叶对生,羽状脉。腋生聚伞花序伞房状;总花梗极短;花萼裂片5枚,锐尖,基部内面有腺体;花白色,花冠高脚碟状,花冠裂片5枚,长圆形,向右覆盖,花冠筒圆柱状,在喉部略为宽大,花冠筒与裂片等长;雄蕊5枚,着生于花冠喉部,全部露出,花丝极短,花药包围柱头而粘于其上,长圆形,顶端渐尖或锐尖,基部楔合;花盘环状,5裂;子房为2个离生心皮所组成,顶端有长柔毛,花柱线形,柱头卵圆形,胚珠多数。蓇葖2枚,宽展象人字;种子倒生,狭长圆形,有长喙;种毛沿种子的长喙而向上轮生。

3种,分布于我国和越南、老挝、柬埔寨。我国产2种,产于云南。

*倒缙木属(中国高等植物图鉴),别名假扭子花属(中国种子植物科属辞典)。