

厘米,宽5毫米;种毛白色绢质,长2.5厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

产于云南南部。生于杂木林中。泰国、越南也有分布。模式标本采自泰国。

5. 清明花 炮弹果(广西);刹抢龙(云南少数民族名)

Beaumontia grandiflora Wall. Tent. Fl. Nep. 15, t. 7. 1824; Lindl. in Bot. Reg. 11: 911. 1825; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 60: 3213. 1833; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 660. 1882; Pitard in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1238. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 2: 160. 1934, A. Henry 11950 excl.——*Echites grandiflora* Roxb. Hort. Beng. 20. 1814, nomen, et Fl. Ind. Carey ed. 2: 14. 1832, descr.

高大藤本;枝幼时有锈色柔毛,老时无毛、茎有皮孔。叶长圆状倒卵形,长6—15厘米,宽3—8厘米,顶端短渐尖,幼时略被柔毛,老渐无毛,稀叶背被浓毛;侧脉约15对;叶柄长2厘米。聚伞花序顶生,着花3—5朵,有时更多;花梗有锈色柔毛,长2—4厘米;花萼裂片长圆状披针形或倒卵形,或倒披针形,长2.5—4厘米;花冠长约10厘米,外面有微毛,裂片卵圆形;雄蕊着生于花冠筒的喉部,花药箭头状。蓇葖形状多变,内果皮亮黄色;种子长约2厘米;种毛白色绢质,长4厘米。花期春夏季,果期秋冬季。

云南野生,生于山地林中;广西、广东和福建有栽培。印度也有。模式标本采自印度。

根和叶供药用,可治风湿性腰腿痛、骨折、跌打损伤等。

23. 倒缬木属*——*Paravallaris* Pierre ex Hua

Pierre ex Hua in Bull. Soc. Linn. Par. n. s. 1: 30. 1898.

灌木或小乔木。叶对生,羽状脉。腋生聚伞花序伞房状;总花梗极短;花萼裂片5枚,锐尖,基部内面有腺体;花白色,花冠高脚碟状,花冠裂片5枚,长圆形,向右覆盖,花冠筒圆柱状,在喉部略为宽大,花冠筒与裂片等长;雄蕊5枚,着生于花冠喉部,全部露出,花丝极短,花药包围柱头而粘于其上,长圆形,顶端渐尖或锐尖,基部楔合;花盘环状,5裂;子房为2个离生心皮所组成,顶端有长柔毛,花柱线形,柱头卵圆形,胚珠多数。蓇葖2枚,宽展象人字;种子倒生,狭长圆形,有长喙;种毛沿种子的长喙而向上轮生。

3种,分布于我国和越南、老挝、柬埔寨。我国产2种,产于云南。

*倒缬木属(中国高等植物图鉴),别名假扭子花属(中国种子植物科属辞典)。