

2. 毛叶倒缨木(植物分类学报)

Paravallaris yunnanensis Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica **11**: 373, Pl. 47. 1973.

小乔木,高 3—5 米;枝条暗灰色,有瘤状凸起,小枝稍压扁,变褐色,无毛。叶腋内有淡褐色的腺体。叶纸质,长椭圆形或长圆形,长 11—24.5 厘米,宽 4—8 厘米,顶端急尖成尾状,尾尖长 1—1.3 厘米,叶基部宽楔形,叶面深绿色,无毛,叶背浅绿色,被短柔毛;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边 17—21 条,弯拱上升,在叶缘前连结;叶柄长 1 厘米,被短柔毛,基部稍粗大,腹部有沟槽。蓇葖叉生,线状长圆形,长 12—15 厘米,直径约 8 毫米,外果皮绿色,无毛,有纵条纹;果柄被短柔毛;种子倒生,狭长圆形,长 2.2—2.5 厘米,直径 2.5—3 毫米,基部急尖,顶端具长喙,喙长 4 厘米,沿喙密生有向上的白黄色绢质种毛,种毛长 4—5 厘米。 果期 4 月。

产于云南南部。生于海拔 650 米山地密林中。模式标本采自云南西双版纳。

24. 帘子藤属*——**Pottsia** Hook. et Arn.

Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 198, t. 43. 1836.

木质藤本,具乳汁。叶对生。圆锥状聚伞花序三至五歧,顶生或腋生;萼片 5 深裂,顶端钝头,内面有腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆状,喉部紧缩,花冠裂片 5 枚,卵圆形或长圆形,向右覆盖;无副花冠;雄蕊 5 枚,着生在花冠喉部;花丝极短,花药箭头状,伸出花冠喉外,而腹部粘生在柱头上,基部具耳;花盘环状,顶端 5 裂;子房具 2 枚离生心皮,花柱中部加厚,柱头椭圆状或纺锤状,顶端圆锥状;胚珠多数。蓇葖双生,线状长圆形,细而长;种子线状长圆形,无喙,顶端具一簇白色绢质种毛;子叶线形、扁平;胚根在上。

约 5 种,分布于亚洲东南部。我国产 3 种,分布于贵州、云南、广西、广东、湖南、江西和福建等省区。

本属模式种为: *Pottsia laxiflora* (Bl.) O. Ktze.

分 种 检 索 表

- 1. 叶被短柔毛 1. 毛帘子藤 *P. pubescens* Tsiang
- 1. 叶无毛。
 - 2. 花冠长 7 毫米,开花时裂片向上展开;花柱中部加厚;子房被长柔毛

* 帘子藤属(中国植物科属检索表),别名薄碱藤属(中国种子植物科属辞典)。