

毫米;种子长圆形,长1—1.2厘米,宽3—4毫米,基部较狭,种皮密被微毛,顶端具白黄色绢质种毛;种毛长3厘米。花期6—10月,果期10月—翌年春季。

产于我国云南南部。生于海拔800—1500米的山地疏林中或密林山谷潮湿地方,攀援大树上。印度、缅甸、老挝、柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等也有分布。模式标本采自马来西亚。

32. 毛药藤属*——*Sindechites* Oliv.

Oliv. in Hook. Ic. Pl. **18**: Pl. 1772. 1888.

木质藤本,枝柔软,具乳汁;茎、枝条无毛。叶对生,具柄,羽状脉,叶片长圆状披针形或卵圆状披针形或卵圆形,具渐尖头。圆锥状聚伞花序顶生或近顶生;花萼小,5裂,裂片卵圆形,双盖覆瓦状排列,内面基部具腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,顶端裂片5枚,向右覆盖;雄蕊5枚,着生在花冠筒中部以上,花丝短,离生,花药卵圆状长圆形,顶部急尖,基部具短耳,腹部中间粘生在柱头基部,药隔顶端被长柔毛;子房由2枚离生心皮组成,花柱丝状,柱头棍棒状,顶端圆锥形2裂,每心皮有胚珠多颗,着生在子房腹缝线的胎座上;花盘环状,5裂,围绕子房周围。蓇葖双生,线状长圆形,无毛;种子线状披针形,顶端具黄白色绢质种毛。

约3种,分布于我国和泰国。我国产2种,产于我国西南部、中部和南部,稀见于东部各省区。

本属模式种为: *Sindechites henryi* Oliv.

分 种 检 索 表

1. 叶长圆状披针形或卵状披针形,顶端具渐尖头;侧脉每边20多条,基部不成三出脉;雄蕊着生在花冠筒近喉部;子房被长柔毛;花盘5深裂,比子房短……………1. 毛药藤 *S. henryi* Oliv.
1. 叶卵圆形,顶端急尖;侧脉每边4—6条,基部呈三出脉;雄蕊着生在花冠筒中部;子房无毛;花盘环状,比子房长……………2. 疣藤 *S. chinensis* (Merr.) Markgr. et Tsiang

1. 毛药藤(峨眉植物图志) 土牛党七(广西);黄经树(四川);蔷薇根(四川中药志) 图版56

Sindechites henryi Oliv. in Hook. Ic. Pl. **18**: Pl. 1772. 1888; Tsiang in Sunyatsenia **3**: 151. 1936, in Fang, Ic. Pl. Omei. **1** (2): Pl. 87. 1944; 中国高等植物图鉴, **3**: 445, 图 4843. 1974.——*Parameria esquirolii* Lév. in Fedde Rep. Sp. Nov.

* 毛药藤属(中国植物科属检索表)。