

9: 325. 1911.——*Antirrhoea martinii* Lév. in Fedde, Rep. 13: 178. 1914.——*Sindechites henryi* Oliv. var. *parvifolia* Tsiang in Sinensia 3: 159. 1932.——*Sindechites esquirolii* Woods. in Journ. Arn. Arb. 15: 316. 1934.

木质藤本，长达 8 米；茎、枝条、叶无毛，具乳汁。叶薄纸质，长圆状披针形或卵状披针形，长 5.5—12.5 厘米，宽 1.5—3.7 厘米，顶端渐尖，呈尾状，尾尖长 1—2 厘米，叶面深绿色，具光泽，叶背浅绿色，两面无毛；中脉和侧脉在叶面扁平，中脉在叶背凸起，侧脉扁平，纤细密生，几平行，每边约 20 多条，达叶缘前互相网结；叶柄长 4—10 毫米，叶柄间及叶腋内具线状腺体。总状式聚伞花序顶生或近顶生，着花多朵；花白色，长 1—1.2 厘米，宽 6 毫米；花萼小，裂片卵圆形，外面无毛，花萼内面有 10—15 枚腺体，腺体顶端 2 裂；花冠长 9 毫米，花冠筒圆筒形，长 7 毫米，喉部膨大，裂片卵圆形，顶端钝，长 2 毫米，宽 1.5 毫米，两面被短柔毛；雄蕊着生在花冠筒近喉部，花丝短，花药卵圆形，内藏，顶端急尖，基部具耳，药隔顶端被长柔毛；子房由 2 枚离生心皮组成，藏于花盘之中，顶端具长柔毛，花柱长 3.5 毫米，柱头顶端 2 裂，每心皮有胚珠多颗；花盘不明显 5 裂，比子房短。蓇葖双生，一长一短，线状圆柱形，渐尖，长 3—14 厘米，直径 2.5—3 毫米，无毛，绿色，外果皮薄；种子线状长圆形，扁平，长 1.3 厘米，宽约 1.5 毫米，顶端具黄色绢质种毛；种毛长 2.5 厘米。花期 5—7 月，果期 7—10 月。

产于贵州、云南、四川、湖北、湖南、广西、江西、浙江等省区。生于海拔 600—1300 米山地疏林中、山腰路旁阳处灌木丛中或山谷密林中水沟旁。模式标本采自湖北宜昌。

本植物在广西民间常作补药用，称之为“土牛党七”，但孕妇忌用。

2. 圯藤(广东儋县) 图版 57

Sindechites chinensis (Merr.) Markgr. et Tsiang in Sunyatsenia 3: 152. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 445, 图 4844. 1974; 海南植物志, 3: 244, 图 692. 1974——*Epigynum chinense* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 262. 1923, et in Lingnan Sci. Journ. 5: 151. 1927.

木质藤本，长达 3 米；幼嫩枝条被短柔毛，老时脱落。叶膜质至近纸质，卵圆形，顶端急尖而钝，基部钝或近圆，长 4—8 厘米，宽 1.8—4 厘米，叶面深绿色，无毛，叶背浅绿色；中脉、侧脉和叶缘被紧贴的柔毛，老时毛渐脱落；侧脉每边 4—6 条，基部呈三出脉；叶柄长 2—3 毫米，被紧贴的柔毛；叶柄间具钻状腺体，腺体被紧贴柔毛。圆锥状聚伞花序顶生和腋生，长约 4 厘米；总花梗和花梗柔弱，初时被紧贴短柔毛，老时脱落；花蕾圆筒形，顶端膨大，圆球形，被短柔毛，花开放时长达 1.8 厘米；苞片小，被紧

贴的短柔毛;花萼裂片椭圆状卵圆形、钝头,长约 1.5 毫米,宽 1 毫米,被缘毛,内面具小腺体;花冠白色,花冠筒圆筒形,长 1.5 厘米,外面无毛,内面中部以上密被紧贴的柔毛,裂片斜卵圆形,钝头,两面被紧贴柔毛,长 3 毫米;雄蕊着生在花冠筒中部,花丝短,花药长圆形,长 1.5 毫米,腹面中部与柱头基部粘生,花药基部具短耳,顶端急尖,药隔顶端具长柔毛;子房无毛,由 2 枚离生心皮组成,花柱丝状,细长,柱头棍棒状,基部膨大呈环状,顶端圆锥状,2 裂,心皮有胚珠多颗;花盘环状,顶端浅 5 裂,围绕子房,比子房长,长约 1.2 毫米。蓇葖双生,线状长披针形,长 7—14 厘米,直径 3—5 毫米,顶端渐尖,绿色,无毛,外果皮薄;种子线状长圆形,两端较狭窄,扁平,长 1.3—1.5 厘米,宽 2 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2.5—2.7 厘米。花期 3—7 月,果期 6 月—翌年 2 月。

产于广东海南。生于低海拔至中海拔山地密林中或溪边灌木丛中,常攀援树上。模式标本采自那大。

种毛长而丰富,有用作填充物。

33. 金平藤属*——*Baissea* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 424. 1844.

攀援灌木。叶对生,具叶柄,羽状脉;叶片椭圆形至长椭圆形或长圆形,稀倒卵形,顶端急尖,具短尖头或尾状,基部钝。聚伞花序圆锥状或伞房状,腋生或顶生,二至三歧;花小;花萼小,5 深裂,内面具腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,顶端 5 深裂,裂片向右覆盖;雄蕊 5 枚着生在花冠筒的中部以下,花丝短,花药箭头状,内藏,腹部与柱头粘连,顶部渐尖,并被有一丛长柔毛,基部具耳;花盘 5 裂,排成环状,每裂片顶端 2 裂;子房上位,由 2 枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多颗,着生在腹缝线的胎座上。蓇葖双生,长圆柱形,内有种子多颗;种子顶端具白色绢质种毛。

约 24 种,分布于热带非洲和亚洲的东南部,我国产 1 种,分布于云南南部和贵州。

本属模式种为: *Baissea multiflora* DC.

金平藤(中国高等植物图鉴) 图版 58

Baissea acuminata (Wight) Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 663. 1882; Trimen, Handb. Fl. Ceyl. 3: 140. 1895; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflan-

* 金平藤属(中国高等植物图鉴)。

