

贴的短柔毛;花萼裂片椭圆状卵圆形、钝头,长约 1.5 毫米,宽 1 毫米,被缘毛,内面具小腺体;花冠白色,花冠筒圆筒形,长 1.5 厘米,外面无毛,内面中部以上密被紧贴的柔毛,裂片斜卵圆形,钝头,两面被紧贴柔毛,长 3 毫米;雄蕊着生在花冠筒中部,花丝短,花药长圆形,长 1.5 毫米,腹面中部与柱头基部粘生,花药基部具短耳,顶端急尖,药隔顶端具长柔毛;子房无毛,由 2 枚离生心皮组成,花柱丝状,细长,柱头棍棒状,基部膨大呈环状,顶端圆锥状,2 裂,心皮有胚珠多颗;花盘环状,顶端浅 5 裂,围绕子房,比子房长,长约 1.2 毫米。蓇葖双生,线状长披针形,长 7—14 厘米,直径 3—5 毫米,顶端渐尖,绿色,无毛,外果皮薄;种子线状长圆形,两端较狭窄,扁平,长 1.3—1.5 厘米,宽 2 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2.5—2.7 厘米。花期 3—7 月,果期 6 月—翌年 2 月。

产于广东海南。生于低海拔至中海拔山地密林中或溪边灌木丛中,常攀援树上。模式标本采自那大。

种毛长而丰富,有用作填充物。

33. 金平藤属*——*Baissea* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 424. 1844.

攀援灌木。叶对生,具叶柄,羽状脉;叶片椭圆形至长椭圆形或长圆形,稀倒卵形,顶端急尖,具短尖头或尾状,基部钝。聚伞花序圆锥状或伞房状,腋生或顶生,二至三歧;花小;花萼小,5 深裂,内面具腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,顶端 5 深裂,裂片向右覆盖;雄蕊 5 枚着生在花冠筒的中部以下,花丝短,花药箭头状,内藏,腹部与柱头粘连,顶部渐尖,并被有一丛长柔毛,基部具耳;花盘 5 裂,排成环状,每裂片顶端 2 裂;子房上位,由 2 枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多颗,着生在腹缝线的胎座上。蓇葖双生,长圆柱形,内有种子多颗;种子顶端具白色绢质种毛。

约 24 种,分布于热带非洲和亚洲的东南部,我国产 1 种,分布于云南南部和贵州。

本属模式种为: *Baissea multiflora* DC.

金平藤(中国高等植物图鉴) 图版 58

Baissea acuminata (Wight) Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 663. 1882; Trimen, Handb. Fl. Ceyl. 3: 140. 1895; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflan-

* 金平藤属(中国高等植物图鉴)。

zenfam. 4, 2: 172. 1895; 中国高等植物图鉴, 3: 446, 图 4845. 1974. — *Cleghornia acuminata* Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 4: t. 1310. 1850. — *Cleghornia cymosa* Wight, l. c. t. 1312.

攀援灌木, 长达 10 米; 茎灰绿色, 具皮孔, 含乳汁, 全株无毛; 叶腋内外具腺体。叶薄纸质, 长圆形或倒卵状长圆形, 稀卵状披针形, 长 7—13.5 厘米, 宽 2.5—5 厘米 (最大的达 16×6.5 厘米), 顶端钝而具尾尖, 尾尖长约 1 厘米, 宽 2 毫米, 两面无毛, 叶面深绿色, 叶背浅绿色; 中脉在叶面略凹入, 在叶背凸起, 侧脉两面扁平, 每边 10—13 条, 斜曲上升, 叶缘前网结; 叶柄长约 1 厘米。聚伞花序通常三歧, 腋生和顶生; 总花梗长 3—11 厘米; 花梗长 4—5 毫米; 花萼裂片卵圆状三角形, 长 2 毫米, 宽 1 毫米, 花萼内面基部具 10 枚腺体; 花黄色, 长 10 毫米, 花展开直径达 6 毫米, 花冠深 5 裂, 花冠筒圆筒形, 比花冠裂片短, 长 3.5 毫米, 内面从雄蕊背面花冠筒上至花冠喉部密被柔毛, 花冠裂片长圆形, 无毛, 顶端钝或圆, 长 6 毫米, 宽 2 毫米; 雄蕊着生在花冠筒中部以下, 长 2.5 毫米, 花丝短, 内面密被柔毛, 花药箭头状, 腹部与柱头粘连, 顶端渐尖, 具一丛白色长柔毛, 基部具耳; 花盘 5 裂, 环绕子房, 比子房短, 每裂片顶部再 2 裂; 子房无毛, 由 2 枚离生心皮组成, 花柱短, 柱头棍棒状, 基部膨大, 顶端 2 裂; 每心皮有胚珠多颗。蓇葖双生, 长圆柱形, 顶端渐尖至钝, 长达 21.5 厘米, 直径约 1.5 厘米, 无毛, 具纵条纹, 绿色; 种子长圆形, 两端狭窄, 扁平, 长 2—3 厘米, 宽约 4 毫米, 棕黄色, 顶端具黄白色绢质的种毛; 种毛长 4 厘米。花期 4—7 月, 果期 7—10 月。

产于云南南部和贵州。生于海拔 500—1600 米的山地疏林中或山坡路旁、溪边灌木丛中或山谷水沟边。斯里兰卡也有分布。模式标本采自斯里兰卡。

34. 鳝藤属*——*Anodendron* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 443. 1844. — *Formosia* Pichon in Bull.

Mus. Hist. Nat. Paris Ser. 2, 20: 300. 1948.

攀援灌木。叶对生, 羽状脉; 侧脉通常呈皱纹。聚伞花序顶生或生于上枝的叶腋内; 花萼 5 深裂, 基部内面有少数腺体, 裂片双盖覆瓦状排列; 花冠高脚碟状; 花冠筒

* 鳝藤属(海南植物志), 别名种葛属(种子植物名称)。

