

贴的短柔毛;花萼裂片椭圆状卵圆形、钝头,长约 1.5 毫米,宽 1 毫米,被缘毛,内面具小腺体;花冠白色,花冠筒圆筒形,长 1.5 厘米,外面无毛,内面中部以上密被紧贴的柔毛,裂片斜卵圆形,钝头,两面被紧贴柔毛,长 3 毫米;雄蕊着生在花冠筒中部,花丝短,花药长圆形,长 1.5 毫米,腹面中部与柱头基部粘生,花药基部具短耳,顶端急尖,药隔顶端具长柔毛;子房无毛,由 2 枚离生心皮组成,花柱丝状,细长,柱头棍棒状,基部膨大呈环状,顶端圆锥状,2 裂,心皮有胚珠多颗;花盘环状,顶端浅 5 裂,围绕子房,比子房长,长约 1.2 毫米。蓇葖双生,线状长披针形,长 7—14 厘米,直径 3—5 毫米,顶端渐尖,绿色,无毛,外果皮薄;种子线状长圆形,两端较狭窄,扁平,长 1.3—1.5 厘米,宽 2 毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长 2.5—2.7 厘米。花期 3—7 月,果期 6 月—翌年 2 月。

产于广东海南。生于低海拔至中海拔山地密林中或溪边灌木丛中,常攀援树上。模式标本采自那大。

种毛长而丰富,有用作填充物。

33. 金平藤属*——*Baissea* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 424. 1844.

攀援灌木。叶对生,具叶柄,羽状脉;叶片椭圆形至长椭圆形或长圆形,稀倒卵形,顶端急尖,具短尖头或尾状,基部钝。聚伞花序圆锥状或伞房状,腋生或顶生,二至三歧;花小;花萼小,5 深裂,内面具腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,顶端 5 深裂,裂片向右覆盖;雄蕊 5 枚着生在花冠筒的中部以下,花丝短,花药箭头状,内藏,腹部与柱头粘连,顶部渐尖,并被有一丛长柔毛,基部具耳;花盘 5 裂,排成环状,每裂片顶端 2 裂;子房上位,由 2 枚离生心皮组成,每心皮有胚珠多颗,着生在腹缝线的胎座上。蓇葖双生,长圆柱形,内有种子多颗;种子顶端具白色绢质种毛。

约 24 种,分布于热带非洲和亚洲的东南部,我国产 1 种,分布于云南南部和贵州。

本属模式种为: *Baissea multiflora* DC.

金平藤(中国高等植物图鉴) 图版 58

Baissea acuminata (Wight) Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. 3: 663. 1882; Trimen, Handb. Fl. Ceyl. 3: 140. 1895; K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflan-

* 金平藤属(中国高等植物图鉴)。