

zenfam. 4, 2: 172. 1895; 中国高等植物图鉴, 3:446, 图 4845. 1974. — *Cleghornia acuminata* Wight, Ic. Pl. Ind. Or. 4: t. 1310. 1850. — *Cleghornia cymosa* Wight, l. c. t. 1312.

攀援灌木, 长达 10 米; 茎灰绿色, 具皮孔, 含乳汁, 全株无毛; 叶腋内外具腺体。叶薄纸质, 长圆形或倒卵状长圆形, 稀卵状披针形, 长 7—13.5 厘米, 宽 2.5—5 厘米 (最大的达 16×6.5 厘米), 顶端钝而具尾尖, 尾尖长约 1 厘米, 宽 2 毫米, 两面无毛, 叶面深绿色, 叶背浅绿色; 中脉在叶面略凹入, 在叶背凸起, 侧脉两面扁平, 每边 10—13 条, 斜曲上升, 叶缘前网结; 叶柄长约 1 厘米。聚伞花序通常三歧, 腋生和顶生; 总花梗长 3—11 厘米; 花梗长 4—5 毫米; 花萼裂片卵圆状三角形, 长 2 毫米, 宽 1 毫米, 花萼内面基部具 10 枚腺体; 花黄色, 长 10 毫米, 花展开直径达 6 毫米, 花冠深 5 裂, 花冠筒圆筒形, 比花冠裂片短, 长 3.5 毫米, 内面从雄蕊背面花冠筒上至花冠喉部密被柔毛, 花冠裂片长圆形, 无毛, 顶端钝或圆, 长 6 毫米, 宽 2 毫米; 雄蕊着生在花冠筒中部以下, 长 2.5 毫米, 花丝短, 内面密被柔毛, 花药箭头状, 腹部与柱头粘连, 顶端渐尖, 具一丛白色长柔毛, 基部具耳; 花盘 5 裂, 环绕子房, 比子房短, 每裂片顶部再 2 裂; 子房无毛, 由 2 枚离生心皮组成, 花柱短, 柱头棍棒状, 基部膨大, 顶端 2 裂; 每心皮有胚珠多颗。蓇葖双生, 长圆柱形, 顶端渐尖至钝, 长达 21.5 厘米, 直径约 1.5 厘米, 无毛, 具纵条纹, 绿色; 种子长圆形, 两端狭窄, 扁平, 长 2—3 厘米, 宽约 4 毫米, 棕黄色, 顶端具黄白色绢质的种毛; 种毛长 4 厘米。花期 4—7 月, 果期 7—10 月。

产于云南南部和贵州。生于海拔 500—1600 米的山地疏林中或山坡路旁、溪边灌木丛中或山谷水沟边。斯里兰卡也有分布。模式标本采自斯里兰卡。

34. 鳝藤属*——*Anodendron* A. DC.

A. DC. Prodr. 8: 443. 1844. — *Formosia* Pichon in Bull.

Mus. Hist. Nat. Paris Ser. 2, 20: 300. 1948.

攀援灌木。叶对生, 羽状脉; 侧脉通常呈皱纹。聚伞花序顶生或生于上枝的叶腋内; 花萼 5 深裂, 基部内面有少数腺体, 裂片双盖覆瓦状排列; 花冠高脚碟状; 花冠筒

* 鳝藤属(海南植物志), 别名种葛属(种子植物名称)。

圆筒状,花喉紧缩,无鳞片,花冠裂片5枚,向右覆盖;雄蕊5枚,着生于花冠筒的基部,花丝极短,花药箭头状,粘生于柱头的中部;花盘环状或杯状,有时端部浅5裂;子房具2个离生心皮,比花盘略长,花柱极短,柱头增厚,有一膨胀环状的基部;胚珠在每个心皮内众多。蓇葖双生,叉开,端部渐尖;种子呈压扁状,卵圆形,有喙;种毛沿种子的喙而生。

约18种,分布于斯里兰卡、印度、越南和马来西亚。我国产6种、2个变种。

本属模式种为: *Anodendron paniculatum* A. DC.

分种检索表

1. 花序顶生或近顶生。

2. 叶长圆状披针形或卵圆状椭圆形,顶端短渐尖,长达10厘米,宽达2.5厘米。

3. 花长约1厘米。

4. 叶长圆状披针形……………1. 鳢藤 *A. affine* (Hook. et Arn.) Druce

5. 叶较厚,坚纸质;花序梗及花较粗壮。

6. 花序直径在12厘米以下……………

……………1a. 鳢藤(原变种) *A. affine* (Hook. et Arn.) Druce var. *affine*

6. 花序直径15—26厘米……………

……………1b. 广花鳢藤 *A. affine* (Hook. et Arn.) Druce var. *effusum* Tsiang

5. 叶较薄,膜质;花序梗及花均柔弱……………

1c. 屏边鳢藤 *A. affine* (Hook. et Arn.) Druce var. *pingpienense* Tsiang et P. T. Li

4. 叶卵圆状椭圆形……………2. 防城鳢藤 *A. fangchengense* Tsiang et P. T. Li

3. 花长约2厘米……………3. 台湾鳢藤 *A. benthamianum* Hemsl.

2. 叶狭披针形,端部钝,通常长仅4厘米(稀达6厘米,宽仅7—11毫米)……………

……………4. 柳叶鳢藤 *A. salicifolium* Tsiang et P. T. Li

1. 花序腋生。

7. 叶无透明腺点……………5. 保亭鳢藤 *A. howii* Tsiang

7. 叶有透明腺点……………6. 腺叶鳢藤 *A. punctatum* Tisang

1. 鳢藤(广东海南)

Anodendron affine (Hook. et Arn.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles

1916: 605. 1917; Tsiang in Sunyatsenia 2: 127. 1934, op. cit. 3: 140. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 446, 图 4846. 1974; 海南植物志, 3: 241, 图 689. 1974. —

图版 58 金平藤 *Baiisaea acuminata* (Wight) Benth. ex Hook. f., 1. 花枝; 2. 花; 3. 花萼展开, 示腺体着生; 4. 雌蕊及花盘; 5. 雄蕊背面观; 6. 蓇葖; 7. 种子。(陈国泽绘)