

1973; 中国高等植物图鉴, 3:447, 图 4848. 1974.

藤状灌木, 老枝黑褐色, 幼枝草灰色, 具乳汁, 除花外无毛。叶狭披针形, 长 5—6.5 厘米, 宽 7—11 毫米, 端部钝或稀短渐尖, 干时有皱纹; 叶柄内腺体钻状。聚伞花序顶生, 长与直径 3—5 厘米; 花萼 5 深裂, 裂片双盖覆瓦状排列, 卵圆形, 无毛, 基部内面具 1—2 个或无腺体; 花冠高脚碟状, 花冠筒圆筒状, 外面无毛, 内面被长柔毛, 裂片长圆形, 基部向右覆盖; 花盘环状; 雄蕊着生于花冠筒的近基部, 花药箭头状; 子房由 2 枚离生心皮组成, 无毛, 柱头短圆锥状。花期 5—8 月。

产于我国台湾和浙江普陀。生于山地林中。日本也有。模式标本采自我国台湾。

5. 保亭鳝藤(海南植物志)

Anodendron howii Tsiang in Sunyatsenia 3: 141, Pl. 15. 1936, Acta Phytotax. Sinica 10: 32. 1965; 海南植物志, 3:242. 1974.

高攀援灌木, 长达 30 米; 小枝有锈色柔毛, 老时无毛。叶纸质, 长圆状椭圆形, 长 10—15 厘米, 宽 4—6 厘米, 端部短渐尖, 基部圆形或广楔形, 下延至叶柄, 除中脉在叶面有毛外其余无毛; 侧脉 14—16 对, 在叶面扁平, 在叶背凸起, 弧形上升, 到边缘前网结; 叶柄长 8—13 毫米, 上面有沟槽, 被柔毛, 老渐无毛。总状式聚伞花序腋生, 比叶为短, 着花 14—20 朵, 长 3.5 厘米, 直径 4 厘米; 总花梗单条或双生, 长 2—2.5 厘米, 具微毛; 花梗纤细, 长 1—2 毫米; 小苞片卵圆形, 长约 1 毫米; 花蕾顶端钝, 长约 6 毫米; 花萼外面具微毛, 内面腺体 5 枚, 裂片卵圆形, 长 1 毫米, 宽 0.5 毫米, 边缘有缘毛; 花冠绿白色, 高脚碟状, 花冠筒的基部略为紧缩, 长 1.5 毫米, 直径 1 毫米, 花冠裂片长圆状镰刀形, 基部最宽, 长 5.5 毫米, 宽 2 毫米, 端部钝, 外面无毛, 内面有疏柔毛; 雄蕊极短, 着生于花冠筒的基部, 花丝极短, 花药箭头状, 长约 1 毫米; 花盘环状, 端部略为 5 裂; 子房无毛, 埋藏于花盘内, 胚珠每心皮 4 排, 花柱短, 花柱头圆锥状。蓇葖作 180° 叉开, 线状披针形, 长 11—11.5 厘米, 直径约 1 厘米, 长渐尖, 基部略为肿胀, 外果皮干时黑色, 被疏柔毛; 种子有喙, 基部圆形, 长 2 厘米, 宽 5 毫米; 种毛羽状, 白色绢质, 长 5 厘米。花期 5—6 月, 果期 6 月。

产于广东(海南)和广西。生于山谷溪旁。模式标本采自广东保亭。

6. 腺叶鳝藤(海南植物志)

Anodendron punctatum Tsiang in Sunyatsenia 2: 129, Pl. 27. 1934, op. cit. 3: 140. 1936; Metc. in Journ. Arn. Arb. 26: 202. 1945; 海南植物志, 3:242. 1974.

图版 59 鳝藤 *Anodendron affine* (Hook. et Arn.) Druce var. *affine*, 1. 花枝; 2. 花; 3. 花萼展开; 4. 雌蕊及花盘; 5. 蓇葖; 6. 种子。(陈国泽绘)

攀援灌木,全株无毛;枝暗棕色,有纵条纹,直径4毫米。叶近革质,长圆形,中部以上略宽,长5.5—8.5厘米,宽1.8—2.7厘米,端部短渐尖,基部楔形,边缘外卷,叶面有光泽,叶背具分散、盾形、棕色无柄的小腺点;中脉在叶面有凹槽,在叶背略为凸起,侧脉达13对,在叶面扁平而有皱纹,上升到边缘前网结。聚伞花序圆锥状,腋生;总花梗长约6厘米,苞片长约1毫米;花萼裂片卵圆状长圆形,锐尖,长2毫米,宽1毫米,基部内面有腺体3枚;花冠筒长3毫米,直径1.5毫米,基部紧缩,在花药背后花冠筒上被有疏长柔毛,花冠裂片长圆状披针形,长4毫米,基部宽2毫米,端部略为镰刀形;雄蕊着生于花冠筒的基部;子房无毛,与花盘等长。蓇葖双生,线状披针形,长11—12厘米,直径1厘米,长渐尖,基部略为肿胀,外果皮灰褐色,无毛,有条纹;种子棕色,卵圆形,长2厘米,宽5毫米,端部有喙,基部圆形;种毛白色绢质,长4厘米。花期4—5月,果期12月。

产于广东(海南)、广西、四川。生于山地密林中。模式标本采自广东保亭。

35. 香花藤属*——*Aganosma* G. Don

G. Don, Gen. Hist. 4: 77. 1837. — *Amphineurion* (A. DC.)

Pichon in Bull. Soc. Bot. Franch. 95: 215. 1948.

攀援灌木。叶对生,具柄,羽状脉,叶片长圆状椭圆形或长圆状披针形。聚伞花序顶生或腋生;总花梗和花梗基部具苞片和小苞片;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面具腺体;花冠漏斗状或高脚碟状,花冠筒圆筒形,顶端5裂,花蕾时裂片向右覆盖,裂片比花冠筒长(中国种);雄蕊5枚,内藏,花药箭头状,腹面靠合在柱头上;花盘5裂,环绕子房;子房由2枚离生心皮组成,胚珠多数,花柱短,柱头圆锥状,顶端2裂。蓇葖圆柱状,延长、叉生;种子多数,扁平,顶端具白(黄)色绢质的种毛。

约15种,分布于印度、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、中国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等。我国产5种,3变种。

本属模式种为: *Aganosma caryophyllata* G. Don

分种检索表

1. 花冠筒比花萼裂片长;花萼内面基部具有25—50枚腺体;叶背侧脉显著凸起,未达叶缘即呈龟背状联结……………1. 香花藤 *A. acuminata* (Roxb.) G. Don

* 香花藤属(中国植物科属检索表)、别名阿根藤属(中国树木分类学)。