

花期3—9月,果期7月—翌年2月。

产于广东,以海南岛为多。生长在低丘陵山坡疏林中或林缘或近海边沙地灌木丛中。分布于印度、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。模式标本采自印度。

2. 云南香花藤(中国高等植物图鉴) 老鼠牛角(云南)

Aganosma harmandiana Pierre in Spire Caout. Indo-Chine 109. 1906; Pitard in Léc. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 3: 1225. 1933; Tsiang in Sunyatsenia 4: 38, Pl. 11, et f. 10. 1939, et 静生汇报, 9: 24. 1939.

攀援灌木,高达8米,全株被黄色绒毛,具乳汁。叶宽长圆形、宽卵形或近圆形,顶端渐尖或急尖至钝,具尖头,稍微凹,基部圆形或钝,长5—16厘米,宽4—12厘米,叶面被毛较少,老时毛脱落,叶背密被黄色绒毛;中脉和侧脉在叶面扁平或微凹,在叶背略凸起,侧脉每边8—10条,到达叶缘网结;叶柄长1—2厘米。聚伞花序顶生,着花稠密,长4—6厘米,宽4.5—11厘米;总花梗长2—6厘米;花梗长约0.5厘米;苞片和小苞片长圆状披针形,长约1厘米;花萼裂片窄披针形,长9—11毫米,宽2毫米,两面被短柔毛,花萼内面基部具5枚腺体;花冠白色,花冠筒比萼片短,长6—7毫米,宽2.5毫米,外面被短绒毛,内面无毛,顶端裂片长圆形,顶端渐尖,长6—7毫米,宽3毫米,外面被短绒毛,内面无毛;雄蕊着生在花冠筒中部,花丝短,花药箭头状,内藏,顶端渐尖,基部具耳,腹部粘生在柱头上;花盘杯状,比子房长,长1.5毫米,顶端边缘截平或微缺;子房由2枚离生心皮组成,顶端被柔毛,花柱长2毫米,顶端膨大,基部缩小,柱头圆锥状;每心皮有胚珠多颗。蓇葖广叉生,线状圆筒形,长8—22厘米,直径8—10毫米,被黄褐色绒毛;种子长圆形,扁平,长1—1.7厘米,直径3—5毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长2—4.5厘米。花期5—8月,果期9月—翌年2月。

产于云南南部。生于海拔600—1400米的山地疏林中或山谷边。喜光、性好湿润土壤环境,常攀援树上。分布于老挝、越南及缅甸。模式标本采自老挝。

3. 广西香花藤(中国高等植物图鉴) 石上羊奶树(广西那坡); 廖刀竹(广西凤山)

Aganosma kwangsiensis Tsiang in Sunyatsenia 4: 37. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 448, 图 4850. 1974. — *Aganosma gracilis* auct., non Hook. f.: Tsiang in Sunyatsenia 4: 37. 1939, 静生汇报, 9: 23. 1939.

攀援灌木,长达9米;幼枝、花序被黄褐色短柔毛。叶纸质,椭圆形至椭圆状长圆形,顶端渐尖至急尖,基部钝或楔形,长5—10厘米,宽1.7—4.7厘米,叶面深绿色,叶背浅绿色,两面无毛;叶柄长1.0—1.5厘米;中脉和侧脉在叶面扁平或微凹,在叶背中