

内面基部具5枚腺体；花冠白色，花冠筒圆筒形，基部稍膨大，内面被长柔毛，长5—9毫米，宽4毫米，裂片倒卵形，顶端圆或钝，长11—14毫米，基部宽4毫米，顶端宽8毫米；雄蕊着生在花冠筒基部，花药箭头状，内藏，顶端渐尖，基部具耳，腹部与柱头粘生；子房被毛，由2枚离生心皮组成，每心皮胚珠多颗，花柱短，顶端膨大，下部收缩，柱头圆锥状；花盘杯状，比子房长，顶端5浅裂。萼筒广叉生，初时被毛，老时毛脱落，长圆柱形，长10—30厘米，直径5—10毫米，下垂；种子长圆形，扁平，两端截平，长约2厘米，宽3—4毫米，顶端种毛白色绢质，长3.5—5厘米。花期3—7月，果期8月—翌年2月。

产于四川、贵州、云南、广西和广东海南。生于海拔500—1700米的山地疏林中、路旁或水沟旁的灌木丛中，攀援树上。模式标本采自贵州。

叶煎水洗，能治皮肤病。

4b. 短瓣香花藤(新拟)

Aganosma schlechteriana Lév. var. **breviloba** Tsiang in Sunyatsenia 4: 34, fig. 9. 1939. — *Aganosma breviloba* Kerr in Kew Bull. 1937: 92. 1937.

本变种与原变种的区别在于：花冠裂片仅长4—5毫米；花盘顶端5裂较深。花期6月。

产于贵州、云南和广西。生于海拔200米丘陵山地林谷中或路旁。泰国也有分布。模式标本采自泰国。

4c. 柔花香花藤(新拟)

Aganosma schlechteriana Lév. var. **leptantha** Tsiang in Sunyatsenia 4: 34. 1939.

与原变种区别在于叶椭圆形，顶端短渐尖，基部楔形，长10.5—12厘米，宽3.5—4.2厘米。聚伞花序柔弱，长8—9厘米，宽12—15厘米。花期6月。

产于云南南部。生于海拔1000—1500米的山地林谷中。模式标本采自思茅。

5. 贵州香花藤(中国高等植物图鉴)

Aganosma navaillei (Lév.) Tsiang in Sunyatsenia 4: 40, fig. 11. 1939. — *Trachelospermum navaillei* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 32. 1914.

攀援灌木，长达7米；枝条具皮孔，含乳汁。叶卵圆形或长卵形，长8.5—12厘米，宽4—6厘米，幼时被短柔毛，老时脱落；侧脉每边约7条。聚伞花序顶生，着花稠密；花梗、花萼、花冠外面均被短柔毛；花萼裂片长圆状披针形，比花冠筒长，长约10毫米，宽2—3毫米；花冠白色，花冠筒基部膨大，喉部内面被长柔毛，长约8毫米，裂片

倒卵形;雄蕊着生在花冠筒基部,花药箭头状、内藏,腹部粘生在柱头上,顶端渐尖,基部具耳;花盘杯状,比子房长,顶端浅5裂;子房无毛,由2枚离生心皮组成,每心皮胚珠多颗,花柱短,上部膨大,下部缩小,柱头渐尖。蓇葖双生,长圆柱形,长达35厘米,直径约1厘米,下垂,无毛;种子长圆形,两端截平或钝,扁平,长1.2—1.7厘米,宽0.3—0.5厘米,顶端种毛黄白色绢质,长3厘米。 花期6月,果期10月。

产于贵州和云南。生于海拔170—900米山地疏林中,常攀援树上。模式标本采自贵州罗甸。

36. 小花藤属*——*Microchites* Miq.

Miq. Fl. Ind. Bat. 2: 456. 1857.

攀援灌木;花序通常被绒毛。叶对生。圆锥状聚伞花序腋生及顶生;花小;花萼5深裂,内面基部有多数腺体,裂片卵圆形;花冠近高脚碟状,花冠筒短,花喉胀大,无鳞片,花冠裂片5枚,向右覆盖;雄蕊5枚,着生于花冠筒的基部,花丝极短,花药披针状箭头形,包围柱头而粘着柱头基部;花盘环状或杯状,全缘或短5裂;子房具2个离生心皮,比花盘为长,花柱短,柱头长圆形棍棒状;胚珠在每个心皮内多数。蓇葖长箸形或近圆柱状;种子长圆形,扁平;种毛白色绢质。

约20种,分布于亚洲热带及亚热带地区。我国产5种,2变种,分布于南部各省区。

本属模式种为: *Microchites schrieckii* Muell.-Arg.

分 种 检 索 表

1. 侧脉密生,水平或近水平伸出。

2. 叶近革质,椭圆状披针形,端部渐尖,基部阔楔形;侧脉每边约30条,在叶背凸起,与中脉成45°—50°角升出;花序长达6厘米,被锈色柔毛;子房顶端被长硬毛……………1. 毛果小花藤 *M. lachnocarpa* Tsiang

2. 叶纸质,长圆状披针形,端部急尖,基部圆形;侧脉每边30条以上,在叶两面均扁平,侧脉互相平行、整齐,与中脉近垂直升出;花序长达14.5厘米,无毛;子房无毛……………2. 平脉藤 *M. formicina* Tsiang et P. T. Li

1. 侧脉疏距,斜曲上升。

3. 叶大形,长8—32厘米,宽2.5—8.5厘米……………3. 麻栗坡小花藤 *M. malipoensis* Tsiang et P. T. Li

* 小花藤属(中国植物科属检索表)。