

4. 茎上节间无气根; 叶长 8—17 厘米, 宽 2.5—6.5 厘米……………
 ……3a. 麻栗坡小花藤 (原变种) *M. malipoensis* Tsiang et P. T. Li var. *malipoensis*
 4. 茎上节间无气根; 叶长 8—17 厘米, 宽 2.5—6.5 厘米……………
 ……3b. 云南小花藤 *M. malipoensis* Tsiang et P. T. Li var. *parvifolia* Tsiang et P. T. Li
 3. 叶小形, 长 3—7 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米。
 5. 叶卵圆状椭圆形, 端部钝尖; 花序被柔毛…………… 4. 小花藤 *M. polyantha* (Bl.) Miq.
 5. 叶倒卵形或椭圆形, 端部钝或微凹; 花序无毛… 5. 上思小花藤 *M. rehderiana* Tsiang

1. 毛果小花藤 (中国高等植物图鉴) 图版 63

Microchites lachnocarpa Tsiang, 静生汇报, 9: 22. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 449, 图 4852. 1974.

高攀援灌木; 小枝幼时有锈色柔毛, 老时无毛, 圆柱状, 有纵长不相等的条纹, 直径 2 毫米, 节间长 4—5 厘米。叶近革质, 无毛, 椭圆状披针形, 长 7.5—14.5 厘米, 宽 2.5—5 厘米, 顶端渐尖, 基部宽楔形; 中脉及侧脉在叶面凹入, 在叶背凸起, 侧脉约 30 对, 与中脉成 45—50 度升出, 在边缘前网结; 叶柄长 1.5 厘米。圆锥聚伞花序延长, 顶生与腋生, 多花; 总花梗被锈色柔毛, 腋生的长 3—8 厘米, 顶生的长 11.5 厘米; 苞片及小苞片卵圆形, 有柔毛, 早落, 不等长, 与花梗均长 2 毫米; 花蕾长圆形, 钝头; 花萼外面有柔毛, 钟状, 5 深裂, 内面基部有众多腺体, 裂片卵圆形, 钝头, 长宽均约 1 毫米; 花冠白色, 高脚碟状, 花冠筒长 3 毫米, 外面无毛, 花冠喉部被皱毛, 花冠裂片向右覆盖, 顶端镰刀形, 长 3 毫米, 宽 1 毫米; 雄蕊着生于花冠筒的基部, 花丝极短, 花药箭头状, 长约 1 毫米; 花盘环状, 顶端浅 5 裂; 子房有 2 个离生心皮, 顶端具长硬毛, 比花盘为长, 花柱极短, 柱头棍棒状, 顶端锐尖。蓇葖线状圆筒形, 向端部略为渐尖, 长 12—24 厘米, 直径 5 毫米, 密被锈色硬毛; 种子未成熟时有微毛, 线状长圆形, 长 3 毫米, 宽 1 毫米; 种毛褐色绢质, 长 2.5 厘米。花期夏秋季, 果期秋冬季。


产于云南南部。生于海拔 800—1400 米山地杂木林中。模式标本采自云南景洪。

为一种橡胶植物。

2. 平脉藤 (植物分类学报) 图版 64

Microchites formicina Tsiang et P. T. Li in Acta Phytotax. Sinica 11: 385, Pl. 50. 1973.

攀援灌木, 长 14 米, 除花萼裂片外面被微毛外, 全株无毛; 小枝节间长 3—5.5 厘米, 直径约 5 毫米。叶腋内有淡褐色的腺体。叶纸质, 长圆状披针形, 长 6—16.5 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 顶部急尖, 基部圆形, 干后灰黑色; 中脉在叶面扁平, 在叶背凸起,



图版 63 毛果小花藤 *Micrechites lachnocarpa* Tsiang, 1.花枝; 2.花; 3.花萼展开, 示腺体着生; 4.花冠筒展开; 5.雌蕊; 6.蓇葖; 7.种子。(陈国泽绘)