

本变种与原变种不同之处为叶较小,长仅 8—17 厘米,宽 2.5—6.5 厘米,花序为明显的聚伞圆锥状,总花梗密被锈色绒毛,长 3.5—4.5 厘米。花期 5 月。

产于云南东南部。生于阔叶林中沟边。模式标本采自麻栗坡。

4. 小花藤(广东海南) 图版 66

Microchites polyantha (Bl.) Miq. Fl. Ind. Bat. **2**: 456. 1857; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 150. 1927; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 126. 1934, op. cit. **3**: 154. 1936, 静生汇报 **9**: 21. 1939; 中国高等植物图鉴, **3**: 450, 图 4853. 1974; 海南植物志, **3**: 239, 图 687. 1974. ——*Tabernaemontana polyantha* Blume Bijdr. 1029. 1826.

攀援灌木;枝纤细,除花序外全株无毛。叶卵圆状椭圆形或椭圆状长圆形,长 6—8 厘米,宽 2.5—4 厘米,顶端短渐尖或锐尖,基部宽楔形;侧脉 10—15 对,几乎直行斜上;叶柄长约 1 厘米。圆锥聚伞花序腋生与顶生;总花梗被柔毛,长 4—9 厘米;花梗被柔毛,长 2—4 毫米;花萼被柔毛,钟状,裂片卵圆形,长 2.5 毫米,基部内面有腺体;花冠白色,花冠筒长 3 毫米,内面及喉部有毛,中间略为胀大,裂片长圆状披针形,长约 2 毫米,宽 1 毫米;雄蕊着生于冠筒的基部;花盘环状,顶端微 5 裂;子房被长柔毛,花柱短,柱头 2 裂。蓇葖长箸形或线状圆柱状,长约 25 厘米,直径 5 毫米;种子顶端具白色绢质种毛。花期 4—6 月,果期 10 月—翌年 3 月。

产于广东、广西和云南等省区。生于海拔 300—800 米的山谷密林潮湿处。分布于印度、马来西亚等地。模式标本采自印度。

5. 上思小花藤(中国高等植物图鉴)

Microchites rehderiana Tsiang, 静生汇报, **9**: 23. 1939.

攀援灌木,长达 2 米,除花冠内面外余皆无毛;小枝圆柱状,红黑色,有小皮孔,直径 1—2 毫米,节间长 1—3 厘米。叶近革质,倒卵形或椭圆形,长 2—3 厘米,宽 8—18 毫米,顶端钝形或有时微凹,基部楔尖,边缘干时略向外反卷;中脉在叶面凹下,在叶背凸起,侧脉 7—8 对,不甚明晰;叶柄长 8 毫米。花序长 3—6 厘米;花梗长 2 毫米;苞片与小苞片卵圆形,长 1 毫米;花萼裂片卵圆形,钝头,长 1.5 毫米,宽 1 毫米,基部内面有多数腺体;花冠黄色,高脚碟状,花冠筒长 3 毫米,花喉内面具髯毛,花冠裂片长圆状披针形,长达 2 毫米,宽 1 毫米;雄蕊着生于花冠筒的近基部,花药箭头状,顶端长渐尖;花盘 5 裂;子房比花盘为长,柱头棍棒状,顶端渐尖。花期 4—7 月。

产于广西南部。生于山地灌木丛中或较干燥山坡上或石上。模式标本采自上思。

