

38. 尖子藤属*——*Rhynchodia* Benth.

Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 719. 1876.

高攀援藤本。叶对生,大,具柄,羽状脉,阔卵形或椭圆状卵圆形。聚伞花序圆锥状,腋生或顶生;花萼5深裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部有腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒形,基部膨大,喉部收缩,无副花冠,花冠裂片5枚,宽大,倒卵形或倒三角形,向右覆盖;雄蕊着生在花冠筒中部,花丝短,花药箭头状,附着在柱头周围,顶端短渐尖,内藏,基部具耳;花盘环状,顶端5裂,比子房短;子房由2枚离生心皮组成,花柱短,柱头卵珠状;每心皮有胚珠多颗,着生在子房腹缝线的胎座上。蓇葖双生,伸长,扁三棱形;种子扁平,长圆形,基部较宽,顶端渐尖,具长尖喙,喙上被种毛。

约8种,分布于东南亚地区。我国产1种,产于南部。

本属与络石属的区别,在于种子有长喙。

本属模式种为: *Rhynchodia rhynchosperma* (Wall.) K. Schum.

尖子藤(中国种子植物科属辞典) 尖种藤(广东海南) 图版 72

Rhynchodia rhynchosperma (Wall.) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 173. 1895; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 150. 1927; Tsiang in Sunyatsenia 2: 132. 1934, in Acta Phytotax. Sinica 10: 32. 1965; 中国高等植物图鉴, 3: 452, 图 4858. 1974; 海南植物志, 3: 243, 图 690. 1947. ——*Echites rhynchosperma* Wall. Pl. Asiat. Rar. 1: 43, Pl. 49. 1830.

高攀援藤本,长约6米;茎和枝条无毛,具疏皮孔,含乳汁;叶柄间和腋中具腺体。叶膜质或纸质,阔卵形或椭圆状卵圆形,长12—22厘米,宽5—12厘米,顶端钝或急尖至尾状渐尖,基部钝或圆,叶面绿色,无毛,叶背浅绿色,被短柔毛;中脉和侧脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边7—15条,弯拱上升,至叶缘相互网结;叶柄长1—3厘米,上面有槽。圆锥状聚伞花序单生于叶腋内或顶生,长7—10厘米,直径5—11厘米;花萼裂片卵形或卵状披针形,长为花冠筒一半,被缘毛,内面具腺体;花冠白色,芳香,花冠筒圆筒形,具5稜,基部膨大,喉部收缩,长5—6毫米,外面无毛,内面密被柔毛,裂片倒卵形或三角形,顶端截形或圆,长8毫米,顶端宽6毫米,外面无毛,内面中部以下被柔毛;雄蕊着生于花冠筒中部,花丝短,花药箭头状,附着于柱头周围,顶端渐尖,基部具尖耳;花盘环绕子房,比子房短,顶端5裂;子房由2个离生心皮组成,

* 尖子藤属(中国种子植物科属辞典),别名尖种藤属(中国植物科属检索表)。