

## 1. 台湾络石(中国高等植物图鉴)

**Trachelospermum foetidum** (Mats. et Nak.) Nak. in Bot. Mag. Tokyo **36**: 21, f. 2. 1922; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 135. 1934. — *T. jasminoides* (Lindl.) Lem subsp. *foetida* Mats. et Nak. in Bot. Mag. Tokyo **22**: 153. 1908.

攀援灌木,全株无毛。叶纸质,椭圆形,长2.5—5厘米,宽1.2—2厘米,顶端钝,基部宽楔形;中脉在叶面凹陷,在叶背凸起,侧脉在叶面扁平,在叶背略凸起;叶柄长5毫米;叶腋内有钻状腺体。花序顶生或腋生;花序梗长1.5—2.5厘米;花梗长6毫米;花蕾顶部渐尖;花萼裂片紧贴在花冠筒上,裂片卵圆形,被疏缘毛,花萼内面基部具有10个齿状腺体;花冠高脚碟状,花冠筒圆筒状,喉部膨大,仅在雄蕊背后筒壁上被短柔毛,花冠裂片倒卵状长圆形;雄蕊着生近花冠喉部,花药箭头状,顶端不明显露出;子房无毛,花丝细长,柱头圆锥状;花盘环状,5裂,围绕子房,比子房短。蓇葖线状长圆形,长20厘米,直径约5毫米;种子顶端具白色绢质种毛。花期6月,果期秋季。

产于我国台湾东部。生于山地林中。日本也有。模式标本采自日本。

## 2. 细梗络石(植物分类学报)

**Trachelospermum gracilipes** Hook. f. Fl. Brit. Ind. **3**: 668. 1882; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 136. 1934; Woods. op. cit. **3**: 91. 1939; Tsiang in Acta Phytotax Sinica **10**: 31. 1965; 海南植物志, **3**: 244. 1974.

## 2a. 细梗络石(原变种)

**Trachelospermum gracilipes** Hook. f. var. *gracilipes*

攀援灌木;幼枝被黄褐色短柔毛,老时无毛。叶膜质,无毛,椭圆形或卵状椭圆形,长4—8.5厘米,宽1.5—4厘米,顶部急尖或钝,基部急尖;叶柄长3—5毫米,被疏短柔毛至无毛;叶腋间和叶腋外的腺体长1毫米;叶脉在叶面扁平,在叶背凸起,每边侧脉约10条,斜曲上升至叶缘前网结。花序顶生或近顶生,着花多朵;总花梗长2.5—4厘米;花白色,芳香;花蕾顶端渐尖;花萼裂片紧贴在花冠筒上,裂片卵状披针形,长2毫米,宽1毫米,花萼内面基部具10个齿状腺体;花冠筒圆筒形,花冠喉部膨大,内面无毛,长5—6毫米,花冠裂片无毛,长6—7毫米,宽3—4.5毫米;雄蕊着生在花冠喉部,花药顶端露出花喉之外,花丝短,被柔毛;花盘环状,5裂,围绕子房基部;子房由2枚离生心皮组成,无毛;胚珠每心皮多颗,着生于腹缝线胎座上,花柱丝状,柱头卵圆状,顶部全缘。蓇葖双生,叉开,线状披针形,长10—28厘米,宽3—4毫米,无毛,外果皮黄棕色;种子多数,红褐色,线状长圆形,长2—2.5厘米,宽约2毫