

产于浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、云南、贵州、四川和西藏等省区。生于山谷及疏林中或水沟边。锡金、斯里兰卡、越南也有。模式标本采自锡金。

植株可提取树脂及橡胶；茎皮纤维拉力强，可代麻制绳和织麻袋。种毛可作填充料。

8. 短柱络石(海南植物志) 图版 77

Trachelospermum brevistylum Hand.-Mazz. in Sitzganz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. **58**: 228. 1921, et Symb. Sin. **7**: 991. 1936; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 149, fig. 17. 1934; Woods. op. cit. **3**: 95. 1936; Pichon in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris Ser. 2, **20**: 191. 1948; 中国高等植物图鉴, **3**: 455, 图 4863. 1974. — *T. cathayanum* auct., non Schneid.: Merr. in Lingnan Sci. Journ. **7**: 321. 1929. — *T. suaveolens* Chun in Sunyatsenia **1**: 298, fig. 4. 1934. — *T. cuneatum* Tsiang in Sunyatsenia **3**: 149. 1936.

木质藤本，较为柔弱，长 2 米，具乳汁，全部无毛。叶薄纸质，狭椭圆形至椭圆状长圆形，长 5—10 厘米，宽 3 厘米，顶端近尾状渐尖，基部钝至宽锐尖，无毛；叶柄长 2—5 毫米。花序顶生及腋生，比叶为短，无毛；花梗长 5—7 毫米；苞片披针形；花萼裂片卵状披针形锐尖，长 1—2 毫米，顶端略为展开，无毛；花白色，花冠筒长 4.5 毫米，基部直径约 1 毫米，向花喉部渐细而具微毛，裂片斜倒卵形，长 6—7 毫米，广展；雄蕊着生于花筒的基部，花药全部隐藏；子房长椭圆状，无毛，柱头近头状；花盘裂片离生，长及子房之半。萼萼叉生，线状披针形，向顶端渐尖，长 11—23.5 厘米，直径 0.3—0.5 厘米，外果皮黄棕色，无毛；种子长圆形，长 1—2.8 厘米，直径 1.5—2.5 毫米；种毛色白绢质，长 2.5—3 厘米。花期 4—7 月，果期 8—12 月。

产于四川、贵州、广西、广东、湖南、福建和安徽等省区。生于海拔 600—1100 米山地空矿疏林中，缠绕于树上或石上。模式标本采自湖南武岗云山。

9. 锈毛络石(中国高等植物图鉴) 大黑骨头、橡胶藤(广西)；六角藤(湖南) 图版 78

Trachelospermum dunnii (Lév.) Lév. Fl. Kouy-Tchéou 31. 1912; Schneid. in Sargent, Pl. Wils. **3**: 340. 1916; Tsiang in Sunyatsenia **2**: 152, fig. 19. 1934, op. cit. **3**: 148. 1936; Woods. op. cit. 98. 1936; 中国高等植物图鉴, **3**: 455, 图 4864. 1974. — *Melodinus dunnii* Lév. in Fedde Rep. Sp. Nov. **9**: 453. 1911.

粗壮木质藤本，长达 15 米，幼嫩部分密被锈色柔毛，老时渐无毛。叶近革质，长圆形至椭圆状披针形，长 6—9 厘米，宽 2—3 厘米，端部渐尖，基部钝至略作心形，叶



图版 77 短柱络石 *Trachelospermum brevistylum* Hand.-Mazz., 1.花枝; 2.花;
3.花冠筒展开; 4.雌蕊及花萼; 5.蓇葖; 6.种子。(吴翠云绘)