

12—18 厘米,直径 5 毫米;种子线形,顶端具黄色种毛,种毛长 3 厘米。花期 8 月,果期 8—10 月。

产于广东和广西。生于海拔 300—500 米山地疏林中。泰国也有。模式标本采自广东保亭。

树皮药用,有宽筋活血之效。

41. 乐东藤属*——*Chunechites* Tsiang

Tsiang in Sunyatsenia 3: 305. 1937.

藤状灌木,有乳汁;叶柄间及叶腋内具少数腺体。叶对生,窄披针形,具柄,具纤细疏离的侧脉。聚伞花序圆锥状,生于顶枝的叶腋中;花萼小,5 深裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具 5 枚腺体,萼片长圆状披针形;花冠近坛状或近辐状,花冠喉部无鳞片,花冠裂片 5 枚,向右覆盖,线状长圆形,弯斜呈不等大镰刀形,外侧边缘中部具一锯齿;雄蕊 5 枚,着生在花冠筒基部,花丝短,花药箭头状披针形,顶头渐尖,基部具耳,腹部与柱头粘生;花盘环状,不明显 5 裂;子房由 2 枚离生心皮组成,比花盘长,顶端被长柔毛;每心皮有胚珠 8—10 颗,4 排;花柱极短,柱头长圆棒状或陀螺状,顶端具尖头,近全缘或短 2 裂。蓇葖双生,略叉开,线状披针形;种子长圆状披针形,顶端具黄色绢质种毛。

1 种,我国特产,分布于浙江和广东(海南)。

本属模式种为: *Chunechites xylinabariopsoides* Tsiang

乐东藤(海南植物志) 图版 81

Chunechites xylinabariopsoides Tsiang in Sunyatsenia 3: 306, Pl. 36. 1937; 中国高等植物图鉴, 3: 457, 图 4867. 1974; 海南植物志, 3: 236, 图 684. 1974. —*Xylinabariopsis ventii* T. D. Ly in Fedde, Rep. 86 (9—10): 500, Abb. 1. 1975.

藤状灌木,长约 1 米,有乳汁;茎皮枝条暗褐色,密被灰褐色短柔毛;枝条圆柱状,直径 1—2 毫米,节间长 2—9 厘米;叶柄间及叶腋内具小腺体,腺体黑褐色,钻状线形,长约 1 毫米。叶近革质,窄披针形,长 3—6 厘米,宽 1.0—1.7 厘米,顶端短渐尖,基部宽楔形;中脉和侧脉在叶面凹入,在叶背略凸起,侧脉每边 5—7 条,明显;叶柄长 2—3 毫米,被灰褐色短柔毛。聚伞花序圆锥状、三歧,腋生,着花约 6 朵,比叶为长,长 5—8 厘米,直径 6 厘米;总花梗被灰褐色短柔毛;小苞片线状披针形,长 3—4 毫米,

* 乐东藤属(海南植物志)。



图版 81 乐东藤 *Chunechites xylinabariopsoides* Tsiang, 1.花枝; 2.花; 3.花冠展开, 示雄蕊着生及花冠裂片边缘的齿; 4.雌蕊及花盘; 5.花蕾; 6.果枝; 7.种子。(吴翠云绘)

被锈色硬毛；花萼裂片长圆状披针形，顶端急尖，长1毫米，宽0.5毫米，外面被锈色硬毛，边缘具缘毛，花萼内面基部具5枚腺体；花冠近坛状或辐状，橙黄色；花蕾钝头，长2—3毫米，直径3毫米；花冠筒比裂片短，外面无毛，内面被疏长柔毛；花冠裂片线状长圆形，呈不等大的镰刀状，长1.5—2毫米，宽约1毫米，顶端钝或圆，外侧边缘中部具一锯齿，裂片向右覆盖，外面无毛，内面具乳头状突起；雄蕊着生在花冠筒的基部，花丝极短，花药箭头状，内藏，长0.8毫米，顶端钝，基部具耳，腹部与柱头粘生；花盘环状，顶端不明显5裂；心皮2，离生，顶端被长柔毛；花柱极短，柱头陀螺状，顶端短2裂；每心皮有胚珠8—10颗，4排。蓇葖2，初时粘生，后略叉开，线状披针形，长5—7厘米，直径约5毫米，顶端渐尖，基部缢缩，外果皮灰褐色，初时被微毛，后脱落无毛，具纵条纹；种子在每个蓇葖中有8—10颗，长圆状披针形，扁平，长1厘米，宽2毫米，顶端缢缩，基部楔形，种皮被锈色短柔毛，顶端具黄色绢质轮生的种毛；种毛长3厘米；子叶卵圆形，胚根短，在上。花期6—9月，果期9月—翌年5月。

产于广东(海南)和浙江。生于山地疏林中。模式标本采自广东海南。

42. 毛车藤属*——*Amalocalyx* Pierre

Pierre in Bull. Soc. Linn. Paris n. s. 1: 28. 1898.

木质藤本。叶对生，宽倒卵形或椭圆状长圆形。聚伞花序近伞房状，腋生；花萼5裂，内面基部腺体很多，裂片长圆形；花冠近钟状，花冠筒中部以下紧缩成圆筒形，花冠裂片5枚，向右覆盖，卵圆形，端圆形；雄蕊5枚，着生在花冠筒中部，花丝极短，具长柔毛，花药箭头状或狭戟形；花盘环状；子房具2个心皮，胚珠多数。蓇葖并生，椭圆状披针形，向端部渐狭；种子卵圆形，种毛黄色绢质。

约2种，分布于泰国、缅甸、老挝。我国产1种，分布于云南。

本属模式种为：*Amalocalyx microlobus* Pierre

毛车藤(中国高等植物图鉴) 酸果藤(云南) 图版 82

Amalocalyx yunnanensis Tsiang, 静生汇报, 9: 19. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 457, 图 4868. 1974. —— *A. burmanicus* Chatt. in Journ. Ind. Bot. Soc. 19: 80, cum fig. 1940.

木质藤本；枝、叶柄、叶、总花梗、小苞片、花萼外面和外果皮都密被锈色的长柔毛，老时无毛；小枝棕色，圆筒状，有不等长的条纹；节间长3—18厘米；腋间及腋内腺

* 毛车藤属(中国高等植物图鉴)。