

12—18 厘米,直径 5 毫米;种子线形,顶端具黄色种毛,种毛长 3 厘米。花期 8 月,果期 8—10 月。

产于广东和广西。生于海拔 300—500 米山地疏林中。泰国也有。模式标本采自广东保亭。

树皮药用,有宽筋活血之效。

41. 乐东藤属*——*Chunechites* Tsiang

Tsiang in Sunyatsenia 3: 305. 1937.

藤状灌木,有乳汁;叶柄间及叶腋内具少数腺体。叶对生,窄披针形,具柄,具纤细疏离的侧脉。聚伞花序圆锥状,生于顶枝的叶腋中;花萼小,5 深裂,裂片双盖覆瓦状排列,内面基部具 5 枚腺体,萼片长圆状披针形;花冠近坛状或近辐状,花冠喉部无鳞片,花冠裂片 5 枚,向右覆盖,线状长圆形,弯斜呈不等大镰刀形,外侧边缘中部具一锯齿;雄蕊 5 枚,着生在花冠筒基部,花丝短,花药箭头状披针形,顶头渐尖,基部具耳,腹部与柱头粘生;花盘环状,不明显 5 裂;子房由 2 枚离生心皮组成,比花盘长,顶端被长柔毛;每心皮有胚珠 8—10 颗,4 排;花柱极短,柱头长圆棒状或陀螺状,顶端具尖头,近全缘或短 2 裂。蓇葖双生,略叉开,线状披针形;种子长圆状披针形,顶端具黄色绢质种毛。

1 种,我国特产,分布于浙江和广东(海南)。

本属模式种为: *Chunechites xylinabariopsoides* Tsiang

乐东藤(海南植物志) 图版 81

Chunechites xylinabariopsoides Tsiang in Sunyatsenia 3: 306, Pl. 36. 1937; 中国高等植物图鉴, 3: 457, 图 4867. 1974; 海南植物志, 3: 236, 图 684. 1974. —*Xylinabariopsis ventii* T. D. Ly in Fedde, Rep. 86 (9—10): 500, Abb. 1. 1975.

藤状灌木,长约 1 米,有乳汁;茎皮枝条暗褐色,密被灰褐色短柔毛;枝条圆柱状,直径 1—2 毫米,节间长 2—9 厘米;叶柄间及叶腋内具小腺体,腺体黑褐色,钻状线形,长约 1 毫米。叶近革质,窄披针形,长 3—6 厘米,宽 1.0—1.7 厘米,顶端短渐尖,基部宽楔形;中脉和侧脉在叶面凹入,在叶背略凸起,侧脉每边 5—7 条,明显;叶柄长 2—3 毫米,被灰褐色短柔毛。聚伞花序圆锥状、三歧,腋生,着花约 6 朵,比叶为长,长 5—8 厘米,直径 6 厘米;总花梗被灰褐色短柔毛;小苞片线状披针形,长 3—4 毫米,

* 乐东藤属(海南植物志)。