

## 分 种 检 索 表

1. 叶片背面有白粉, 较小, 长 3—7 厘米; 茎皮上无明显皮孔; 蓇葖外皮有明显斑点……………1. 酸叶胶藤 *E. rosea* Hook. et Arn.  
 1. 叶片背面淡绿色, 较大, 长 5—10 厘米; 茎皮上有明显皮孔; 蓇葖外皮无明显斑点……………2. 花皮胶藤 *E. utilis* Hay. et Kaw.

1. 酸叶胶藤(广州植物志) 头林心(广西思乐); 斑鸠藤、厚皮藤(广东海南); 藤风、十八症、三酸藤、红背酸藤、牛卷藤、伞风藤、黑风藤(广西); 酸叶藤(云南); 细叶榕藤、石酸藤(湖南); 乳藤(种子植物名称) 图版 83 (1—6)

***Ecdysanthera rosea*** Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. 198, t. 42. 1836; A. DC. Prodr. 8: 442. 1844; Benth. Fl. Hongkong. 222. 1861; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 98. 1889; Mats. et Hay. Enum. Pl. Form. 12: 251. 1906; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. 10: 169. 1912; Schneid. in Sargent, Pl. Wils. 3: 342. 1916; Tsiang in Sunyatsenia 2: 116. 1936, op. cit. 3: 140. 1936, 静生汇报, 9: 20. 1939; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 235. 1937; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 786, f. 316. 1963; 中国高等植物图鉴, 3: 458, 图 4869. 1974; 海南植物志, 3: 236, 图 685. 1974. — *Antirrhoea esquirolii* Lév. Fl. Kouy-Tchéou 364. 1914—15.

高攀木质大藤本, 长达 10 米, 具乳汁; 茎皮深褐色, 无明显皮孔, 枝条上部淡绿色, 下部灰褐色。叶纸质, 阔椭圆形, 长 3—7 厘米, 宽 1—4 厘米, 顶端急尖, 基部楔形, 两面无毛, 叶背被白粉; 侧脉每边 4—6 条, 疏距。聚伞花序圆锥状, 宽松展开, 多歧, 顶生, 着花多朵; 总花梗略具白粉和被短柔毛; 花小, 粉红色; 花萼 5 深裂, 外面被短柔毛, 内面具有 5 枚小腺体, 花萼裂片卵圆形, 顶端钝; 花冠近坛状, 花冠筒喉部无副花冠, 裂片卵圆形, 向右覆盖; 雄蕊 5 枚, 着生于花冠筒基部, 花丝短, 花药披针状箭头形, 基部具耳, 顶端到达花冠筒喉部, 腹面贴生于柱头上; 花盘环状, 全缘, 围绕子房周围, 比子房短; 子房由 2 枚离生心皮所组成, 被短柔毛, 花柱丝状, 柱头顶端 2 裂。蓇葖 2 枚, 叉开成近一直线, 圆筒状披针形, 长达 15 厘米, 外果皮有明显斑点; 种子长圆形, 顶端具白色绢质种毛。花期 4—12 月, 果期 7 月—翌年 1 月。

分布于长江以南各省区至台湾。生于山地杂木林山谷中、水沟旁较湿润的地方。越南、印度尼西亚也有分布。模式标本采自广东南部岛屿。

植株含胶质地良好, 是一种野生橡胶植物。全株供药用, 民间有用作治跌打瘀肿、风湿骨痛、疔疮、喉痛和眼肿等。

