

产于云南、贵州、广西和广东等省区。生于海拔 500—1500 米山地疏林中或山谷密林中，攀援树上。印度、缅甸、斯里兰卡和越南等均有分布。模式标本采自印度。

根含有强心甙，具有强心作用。根和果实民间常用于祛风、止鼻血、消水肿及治乳癌；叶外用治疮毒。茎皮纤维坚韧，常作绳索；种毛作填充物。

2. 杠柳族——Trib. *Periploceae* G. Don

G. Don, Gen. Hist. 4: 161. 1837.

副花冠与花丝同时着生于花冠的基部；与花丝合生。

本族我国产 4 属。

3. 马莲鞍属*——*Streptocaulon* Wight et Arn.

Wight et Arn. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 64. 1834; Benth.

et Hook. f. Gen. Pl. 2: 744. 1876.

木质藤本、半灌木或灌木，具乳汁。叶对生，具柄，羽状脉。聚伞花序圆锥状，三歧，腋生；花小；花萼小，5 深裂，裂片双盖覆瓦状排列，花萼内面基部具 5 个小腺体；花冠辐状，花冠筒极短，花冠裂片深 5 裂，卵圆形，向右覆盖；副花冠 5 裂，丝状，内弯，其基部与花丝同时着生于花冠的基部，并与花丝背部合生；雄蕊 5 枚，花丝离生，丝状或钻状，花药与柱头顶部贴连，药隔顶上的膜片在柱头顶合生；花粉器匙形，载粉器内藏有许多四合花粉，基部具 1 粘盘；子房具 2 个离生心皮，每心皮胚珠多数，柱头凸起或凹陷。蓇葖 2 个，叉生，圆柱状，平滑；种子顶端具白色绢质种毛。

约 5 种，分布于亚洲东南部。我国产 2 种，分布于广西、贵州和云南。

本属模式种为：*Streptocaulon kleinii* Wight et Arn.

分 种 检 索 表

1. 叶中部以上较宽，倒卵形或阔椭圆形，顶端急尖或钝……………1. 马莲鞍 *S. griffithii* Hook. f.
1. 叶中部较宽；宽卵形或近圆形，顶端钝或圆形……………2. 暗消藤 *S. juvenas* (Lour.) Merr.

1. 马莲鞍(云南) 古羊藤、南苦参、有毛老鸦嘴、虎阴藤(广西)；红藤、藤苦参、地苦参、小暗消(云南)；哈骂醒合(傣语)；哈骂不果(哈语) 图版 92

Streptocaulon griffithii Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 10. 1883; Craib in Kew

* 马莲鞍属(中国植物科属检索表)。