

Bull. Misc. Inf. 1911: 415. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 33. 1912; Tsiang in Sunyatsenia 2: 176. 1934, op. cit. 4: 96. 1939; 中国高等植物图鉴, 3: 464, 图 4881. 1974.

木质藤本,具乳汁;茎褐色,具皮孔;枝条、叶、花梗、果实均密被棕黄色绒毛,老枝被毛渐渐脱落。根圆柱状,弯曲,木质,根皮暗棕色,有瘤状突起和不规则的纵皱纹。叶厚纸质,倒卵形至阔椭圆形,长7—15厘米,宽3—7厘米,中部以上较宽,顶端急尖或钝,具小尖头,基部浅心形,叶面深绿色,叶背浅绿色,干后灰褐色;中脉和侧脉在叶面凹陷,在叶背略凸起,侧脉每边14—18条,羽状脉平行;叶柄长3—7毫米。聚伞花序腋生,三歧,阔圆锥状;花序梗和花梗有许多苞片和小苞片着生;苞片和小苞片卵状披针形,外面密被绒毛;花小,花蕾近圆形,长和宽约3毫米;花冠外面黄绿色,内面黄红色,辐状,花冠筒短,裂片卵圆形,向右覆盖;副花冠裂片丝状,与花丝背部合生,着生在花冠的基部;花丝离生,丝状,或钻状,花药与柱头顶贴连,药隔顶上的膜片在柱头顶合生;花粉器匙形,载粉器内藏有许多四合花粉,基部的粘盘贴在柱头上;子房被柔毛,心皮离生,柱头圆锥状凸起。蓇葖双生,张开成直线或达 200° 角,圆柱状,长7—12厘米,直径5—7毫米,外果皮密被绒毛;种子长圆形,扁平,长9毫米,宽3毫米,棕褐色,顶端种毛白色或淡黄白色;种毛长3厘米。花期6—10月,果期8月—翌年3月。

产于广西、贵州和云南。生于山野坡地、山谷疏林中或路旁灌木丛中。分布于印度、缅甸、泰国和越南。模式标本采自缅甸。

根供药用,可治痢疾、湿热腹泻、心胃气痛、感冒发烧、慢性肾炎、跌打。叶有毒,误食会引起头晕、腹泻,但可外用治毒蛇咬伤和烂疮等。

2. 暗消藤(云南)

Streptocaulon juvenas (Lour.) Merr. in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. 24(2): 315. 1935; Tsiang in Sunyatsenia 4: 97. 1939. — *Apocynum juvenas* Lour. Fl. Cochinch. 167. 1790, et ed. Willd. 208. 1793. — *Streptocaulon tomentosum* Wight et Arn. in Wight, Contrib. Bot. Ind. 64. 1834.

常绿木质藤本,具乳汁,除花冠外,全株密被绒毛,茎和老叶面被毛渐脱落。叶厚纸质,宽卵形或近圆形,中部较宽,长9—14厘米,宽6—9.5厘米,顶端钝或圆形,具小尖头,基部心形;中脉在叶面微凹,在叶背凸起,侧脉两面扁平,每边14—20条,近平行斜出;叶柄长5—7毫米。聚伞花序宽圆锥状,二至三歧,腋生;花小,黄褐色;花萼内面有5个小腺体;花冠辐状,无毛,花冠筒短,裂片卵圆形,长3毫米,宽1.5毫米;副花冠裂片丝状,长过花药顶,顶端内弯,基部着生在花冠基部;雄蕊5,着生于花

冠筒基部,花丝离生,背部与副花冠裂片合生,花药倒卵形,在柱头顶贴连,药隔上的膜片在柱头顶合生;子房具2枚离生心皮,被柔毛,柱头隆起。蓇葖叉生成直线,长圆状披针形,长9—13厘米,直径5—7毫米,被绒毛;种子长圆形,长6毫米,宽2毫米,顶端具白色绢质种毛;种毛长3.5厘米。花期5—8月,果期9—12月。

产于广西和云南。生于海拔300—1000米山地疏林中或丘陵、山谷密林中,攀援树上。印度、缅甸、越南、老挝、柬埔寨和马来西亚等有分布。模式标本采自印度支那。

4. 翅果藤属*——*Myriopteron* Griff.

Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. 4: 385. 1844.

木质藤本,具乳汁。叶对生,膜质,具长柄,羽状脉。聚伞花序圆锥状,疏散,腋生;花小;花萼5裂,裂片双盖覆瓦状排列,花萼内面基部具5个小腺体;花蕾阔圆锥状;花冠辐状,花冠筒短,花冠裂片5枚,狭;副花冠为5枚鳞片组成,与花丝同着生于花冠的基部,鳞片上部丝状,基部阔;雄蕊生于花冠的基部,花丝下部相连成一环,花药顶端具膜片;花粉器匙形,其上部载花粉器藏有许多四合花粉,下部有1花粉器柄和粘盘;子房具2枚离生心皮,每心皮有胚珠多个,柱头隆起,顶端2裂。蓇葖椭圆状长圆形,基部膨大,外果皮具有很多膜质的纵翅;种子顶端具白色绢质种毛。

1种,产于我国西南各省区。分布于印度、缅甸、泰国、越南、老挝、印度尼西亚和马来西亚等。

本属模式种为: *Myriopteron extensum* (Wight) K. Schum.

翅果藤(中国高等植物图鉴) 奶浆果(广西); 大对节生(云南新平); 野甘草(云南元江); 婆婆针线包(云南) 图版 93

Myriopteron extensum (Wight) K. Schum. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4, 2: 215, fig. 64-k. 1895; Craib in Kew Bull. Misc. Inf. 1911: 415. 1911; Cost. in Lec. et Humb. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 35. 1912; Tsiang in Sunyatsenia 2: 177. 1934, oo. cc. 3: 161. 1936, 4: 97. 1939; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 992. 1936; 中国高等植物图鉴, 3: 464, 图 4882. 1974.——*Streptocaulon extensum* Wight, Contrib. Bot. Ind. 65. 1834.——*Myriopteron paniculatum* Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. 4: 385. 1844.——*Streptocaulon extensum* Wight var. *paniculatum* Kurz, For. Fl.

* 翅果藤属(中国高等植物图鉴), 别名婆婆针线包属(中国植物科属检索表), 多翅果属(中国种子植物科属辞典)。